

هونبیار او سالم ژمی ولری

د سخت ناروغۍ خطر کمولو لپاره د COVID-19، زکام او RSV واکسینونو په اړه اډیټ اوسئ.



کله چې ناروغ وي په کور کې پاتې شئ او د COVID-19 لپاره معاینه وکړئ. که لومړی د انټیجن (antigen) ازموینه منفي وي، ډاډ ترلاسه کړئ چې له 24 څخه تر 48 ساعتونو وروسته بیا ازموینه وکړئ! که نښې نښانې خرابې شي یا تاسو اندیښنه لرئ، د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ.



که چیرې د COVID-19 لپاره مثبت ازموینه وشي د **درملنې** لپاره **پلان ولری**. تاسو باید د نښو نښانو د پیل څخه د 5 ورځو دننه خوراکی درملنه پیل کړئ.



غونډې کوچنۍ او بهر یا **ښه تهویه شوی** وساتئ.



په عامه کور دننه چاپیریال کې د **ماسک اغوستل** په پام کې ونیسئ، په ځانګړي توګه که تاسو د ناروغۍ لوړ خطر کې یاست (له 65 څخه ډیر او/یا هغه خلک چې ځینې روغتیايي شرایط لري).



لاسونه په مکرر ډول ومینځئ او خپل ټوخی یا پرنجی پوښخ کړئ.



ALAMEDA COUNTY HEALTH CARE SERVICES AGENCY
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT



د نورو معلوماتو لپاره،
ته covid-19.acgov.org
مراجعه وکړئ یا QR کوډ
سکن کړئ: