




مثل یک حرفه‌ای تست بگیرید

در اینجا نحوه قرائت نتایج تست آورده شده است

نتایج مثبت ممکن است همانطور که در مثال‌های زیر نشان داده شده به صورت پررنگ یا کم‌رنگ ظاهر شوند. هرگونه خط صورتی تا قرمز یا سایه این رنگی ظاهر شده در تست نشان‌دهنده نتیجه مثبت است.



نتایج منفی فقط یک خط کنترل را نشان خواهند داد.



درمان‌های خوراکی کووید-19 مانند Paxlovid باید ظرف 5 روز پس از شروع علائم داده شوند. مهم است که به محض بروز علائم تست بدهید. گاهی اوقات تست آنتی‌ژن می‌تواند منفی باشد حتی اگر مبتلا به کووید باشید، بنابراین حتماً خود را قرنطینه کنید و 24 تا 48 ساعت بعد دوباره تست بدهید.

افرادی که بیش از 50 سال سن دارند یا دارای شرایط پزشکی هستند یا از نظر واکسیناسیون کووید به‌روز نیستند، در صورت منفی بودن آزمایش آنتی‌ژن، باید آزمایش PCR را در نظر بگیرند. تست‌های PCR بیشتر احتمال دارد عفونت را زود تشخیص دهد، بنابراین زودتر متوجه می‌شوید که مثبت شده‌اید و می‌توانید درمان شوید.



نتایج نامعتبر زمانی اتفاق می‌افتد که هیچ خط کنترلی وجود نداشته باشد یا اصلاً خطی وجود نداشته باشد. این بدان معنی است که باید یک تست دیگر بدهید.