

የመጸው(ፎል)-ክረምት(ዊንተር) ክትባቶች

እነዚህ ክትባቶች ለምን አስፈላጊ ናቸው?

COVID-19፣ ኢንፍሉዌንሻ (ፍሉ) እና የመተንፈሻ አካል ኢንፎክሽን አምጪ ቫይረስ (RSV) ክትባቶች ለከባድ በሽታ የሚኖረውን ተጋላጭነትን ይቀንሳሉ። ሶስቱንም ክትባቶች በአንድ ጊዜ መውሰድ ይችላሉ።

ክትባት

ክትባቱን ማግኘት ለማን ይመከራል?

ኢንፍሉዌንሻ



4 የኢንፍሉዌንሻ ቫይረስ ዓይነቶች ላይ ያነጣጠረ ነው።

6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆነ ሁሉ የእንቁላል አለርጂ ያለባቸው ሰዎችም ጭምር አንድ ዶዛ መከተብ አለበት።

ከ8 አመት በታች የሆኑ ልጆች የመጀመሪያው ወቅት ሁለት ዶዛ መውሰድ አለባቸው።

COVID-19



የአምራኩን ንዑስ አይነት የሆነ፣ XBB ኢላማ በማድረግ ክትባቱ ተሸሽሏል።

የተሸሻሉ የሞደርና (Moderna)፣ ፋይዘር (Pfizer) እና ኖቫ-ቫክስ (Novavax) ክትባቶች ይገኛሉ።

CDC 6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆነ ሁሉም ሰው ካለፈው ክትባት ወቅት ቢያንስ ከ2 ወራት በኋላ የተሸሻለ የCOVID-19 ክትባት እንዲከተብ ይመክራል።

- ያልተከተቡ አብዛኛዎቹ ሰዎች ወቅታዊ ክትባት እንዳገኙ ለመቆጠር አንድ ዶዛ Pfizer/Moderna ወይም ሁለት ዶዛ Novavax መከተብ ያስፈልጋቸዋል።
- ከ6 ወር እስከ 4 አመት የሆኑት ህጻናት እስካሁን ያልተከተቡ ከሆኑ፣ ሁለት ወይም ሶስት ዶዛ የCOVID-19 ክትባት እንዲወስዱ ይመከራሉ።

RSV¹



የመተንፈሻ አካል ኢንፎክሽን አምጪ ቫይረስ (RSV)። የመተንፈሻ አካል ኢንፎክሽን አምጪ ቫይረስ (RSV) በህጻናት እና በእድሜ ባለጸጎች አዋቂዎች ላይ ከፍተኛ ኢንፎክሽን ያስከትልባቸዋል።

ዕድሜያቸው 60 እና ከዚያ በላይ የሆኑ አዋቂዎች የጤና እንክብካቤ አቅራቢቸውን/ፋርማሲስታቸውን ስለ የመተንፈሻ አካል ኢንፎክሽን አምጪ ቫይረስ (RSV) ክትባት መጠየቅ አለባቸው።

ነፍሱ ጡሮች በመተንፈሻ አካል ኢንፎክሽን አምጪ ቫይረስ (RSV) ወቅት በ32 እና 36 ሳምንታት መካከል አንድ ዶዛ መከተብ አለባቸው (ጨቅላው ህፃን ከተወለደ በኋላ ለወራት የሚቆይ የበሽታ መከላከያ ያገኛል)።

¹ ነፍሱ ጡሮ ሴት የRSV ክትባት ካልወሰደች፣ ህፃኑ አንድ ዶዛ የበሽታ መከላከያ ክትባት (RSV) ሞኖክሎናል አንቲቦዲ እንዲወስድ ይመከራል ። ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው እስከ 19 ወር የሚደርሱ ህጻናት/ታዳጊዎች አንድ ዶዛ እንዲወስዱ ይመከራል።



ለበለጠ መረጃ፣
covid-19.acgov.org/vaccines
የሚለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ
ወይም የ QR ኮዱን ስካን ያድርጉ።

