

秋冬季節疫苗

這些疫苗為什麼重要？

COVID-19、流行性感冒（流感）和呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗可減少重大疾病風險。三種疫苗可以同時接種。

疫苗

建議哪些人群接種？

流行性感冒



針對 4 種流行性感
冒病毒。

年滿6個月的人群均應接種一劑疫苗，其中包括對雞蛋過敏人群。

8歲及以下兒童應在第一季度內接種兩劑疫苗。

COVID-19



針對奧密克戎（
Omicron）亞型變異株
XBB的更新版疫苗。

更新版Moderna、Pfizer
和Novavax疫苗可供選
擇。

疾病預防和控制中心（CDC）建議，年滿6個月的人
群應在接種上一劑COVID-19疫苗後至少2個月再次
接種一劑更新版疫苗。

- 大多數從未接種過疫苗的人需要接種一劑
Pfizer/Moderna疫苗或兩劑Novavax疫苗，才算完
成最新疫苗接種。
- 目前仍建議從未接種過疫苗的6個月至4歲兒童接
種兩劑或三劑COVID-19疫苗。

RSV¹



針對呼吸道合胞病毒（
RSV）。RSV會導致嬰
兒和老年人患嚴重的呼
吸道疾病。

60歲及以上老年人應向其醫療服務提供者/藥劑師諮
詢RSV疫苗。

RSV流行時，孕婦應在孕期32至36週之間接種一劑
疫苗（嬰兒出生後將連續數月受到保護）。

¹ 如果孕婦未接種RSV疫苗，建議讓嬰兒接種一劑RSV單株抗體。此外，我們還建議風險較高的19個月以下嬰兒/學步期兒童也接種一劑疫苗。

