

د مني - ژمي واکسينونه

ولی دا واکسينونه مهم دي؟

د COVID-19، والگي او د تنفسي مجرا وروس (RSV) واکسينونه د شديدو ناروغيو خطر را کموي. تاسو کولای شئ په يوه وخت ټول دري واکسينونه ترلاسه کړئ.

واکسين

چا ته د هغي د ترلاسه کولو سپارښتنه کيږي؟

انفولانزا



د انفولانزا وروس 4 څپي موخه گرځوي.

هر شخص چې 6 مياشتي يا له هغي څخه زيات عمر لري، حتی هغه کسان چې د هگی حساسيت لري، بايد يو ډوز ترلاسه کړي.

هغه ماشومان چې 8 کاله يا له هغي کم عمر لري، بايد په لومړي مرحله کې دوه ډوزه ترلاسه کړي.

COVID-19



د XBB د موخه گرځولو لپاره د اوميكرون يوه فرعي څپه اډيټ شوي ده.

د Moderna، Pfizer او Novavax اډيټ شوي واکسينونه د لاسرسي وړ دي.

د ناروغيو د کنټرول مرکز (CDC) سپارښتنه کوي، هر څوک چې 6 مياشتي يا له هغي زيات عمر لري، بايد لږ تر لږه د خپل وروستي ډوز څخه 2 مياشتي وروسته د COVID-19 اډيټ شوي واکسين ترلاسه کړي.

- ډيري هغه خلک چې په مرکز کې نه دي واکسين شوي، د اډيټ پاتې کېدو لپاره د Pfizer/Moderna يو ډوز يا د Novavax دوو ډوزونو ته اړتيا لري.
- هغه ماشومان چې له 6 مياشتو څخه تر 4 کلونو پورې عمر لري او تر اوسه يې واکسين شوي نه وي، اوس هم وړانديز کيږي چې دوی د COVID-19 دوه يا درې ډوزونه ترلاسه کړي.

RSV¹



د تنفسي مجرا وروس (RSV) موخه گرځوي. RSV کولای شي په ماشومانو او لویانو کې د شديدې تنفسي ناروغۍ سبب شي.

هغه لویان چې 60 کاله يا له هغي زيات عمر لري بايد د خپلو روغتيايي خدمتونو له چمتو کونکي/فارمسيست څخه د RSV واکسين وغواړي.

میندواري میرمنې باید یو ډوز د RSV د موسم پر مهال د 32 او 36 اونيو ترمنځ ترلاسه کړي (ماشوم داسې خوندي کونکي تر لاسه کوي چې له زيږون وروسته د مياشتو لپاره دوام مومي).

که چېرې يوه ميندواره ميرمن د RSV واکسين ترلاسه نه کړي، د ماشوم لپاره د RSV د مونوکلونال انټي باډي د يوه ډوز سپارښتنه کيږي. لور¹ خطر لرونکي لویانو/نويو په خاپوړو راغلو ماشومانو ته هم تر 19 مياشتو پورې د يوه ډوز سپارښتنه کيږي.



ALAMEDA COUNTY HEALTH CARE SERVICES AGENCY
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

د لا زياتو معلوماتو لپاره - covid-
ته [19.acgov.org/vaccines](https://www.acgov.org/vaccines)

مراجعه وکړئ
يا QR کوډ سکڼ کړئ:



د مني - ژمي واکسينونه

ولی دا واکسينونه مهم دي؟

د COVID-19، والکي او د تنفسي مجرا وروس (RSV) واکسينونه د شديدو ناروغيو خطر را کموي. تاسو کولای شئ په يوه وخت ټول دري واکسينونه ترلاسه کړئ.

واکسين

چا ته د هغي د ترلاسه کولو سپارښتنه کيږي؟

انفولانزا



د انفولانزا وروس 4 څپي موخه گرځوي.

هر شخص چې 6 مياشتي يا له هغي څخه زيات عمر لري، حتی هغه کسان چې د هگی حساسيت لري، بايد يو ډوز ترلاسه کړي.

هغه ماشومان چې 8 کاله يا له هغي کم عمر لري، بايد په لومړي مرحله کي دوه ډوزه ترلاسه کړي.

COVID-19



د XBB د موخه گرځولو لپاره د اوميکرون يوه فرعي څپه اډيټ شوي ده.

د Moderna، Pfizer او Novavax اډيټ شوي واکسينونه د لاسرسي وړ دي.

د ناروغيو د کنټرول مرکز (CDC) سپارښتنه کوي، هر څوک چې 6 مياشتي يا له هغي زيات عمر لري، بايد لږ تر لږه د خپل وروستي ډوز څخه 2 مياشتي وروسته د COVID-19 اډيټ شوي واکسين ترلاسه کړي.

- ډيري هغه خلک چې په مرکز کي نه دي واکسين شوي، د اډيټ پاتي کېدو لپاره د Pfizer/Moderna يو ډوز يا د Novavax دوو ډوزونو ته اړتيا لري.
- هغه ماشومان چې له 6 مياشتو څخه تر 4 کلونو پورې عمر لري او تر اوسه بي واکسين شوي نه وي، اوس هم وړانديز کيږي چې دوی د COVID-19 دوه يا دري ډوزونه ترلاسه کړي.

RSV¹



د تنفسي مجرا وروس (RSV) موخه گرځوي. RSV کولای شي په ماشومانو او لويانو کي د شديدې تنفسي ناروغۍ سبب شي.

هغه لويان چې 60 کاله يا له هغي زيات عمر لري بايد د خپلو روغتيايي خدمتونو له چمتو کونکي/فارمسيست څخه د RSV واکسين وغواړي.

ميندواري ميرمنې بايد يو ډوز د RSV د موسم پر مهال د 32 او 36 اونيو ترمنځ ترلاسه کړي (ماشوم داسي خوندي کونکي تر لاسه کوي چې له زيږون وروسته د مياشتو لپاره دوام مومي).

که چېرې يوه ميندواره ميرمن د RSV واکسين ترلاسه نه کړي، د ماشوم لپاره د RSV د مونوکلونال انټي باډي د يوه ډوز سپارښتنه کيږي. لور¹ خطر لرونکي لويانو/نويو په خاپوړو راغلو ماشومانو ته هم تر 19 مياشتو پورې د يوه ډوز سپارښتنه کيږي.



ALAMEDA COUNTY HEALTH CARE SERVICES AGENCY
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

د لا زياتو معلوماتو لپاره - covid-
ته [19.acgov.org/vaccines](https://www.19.acgov.org/vaccines)

مراجعه وکړئ
يا QR کوډ سکڼ کړئ:



د مني - ژمي واکسينونه

ولي دا واکسينونه مهم دي؟

د COVID-19، والگي او د تنفسي مجرا وروس (RSV) واکسينونه د شديدو ناروغيو خطر را کموي. تاسو کولای شئ په يوه وخت ټول دري واکسينونه ترلاسه کړئ.

چا ته د هغي د ترلاسه کولو سپارښتنه کيږي؟

واکسين

هر شخص چې 6 مياشتي يا له هغي څخه زيات عمر لري، حتی هغه کسان چې د هگی حساسيت لري، بايد يو ډوز ترلاسه کړي.

هغه ماشومان چې 8 کاله يا له هغي کم عمر لري، بايد په لومړي مرحله کې دوه ډوزه ترلاسه کړي.

انفولانزا

د انفولانزا وروس 4 څپي موخه گرځوي.



د ناروغيو د کنټرول مرکز (CDC) سپارښتنه کوي، هر څوک چې 6 مياشتي يا له هغي زيات عمر لري، بايد لږ تر لږه د خپل وروستي ډوز څخه 2 مياشتي وروسته د COVID-19 اپډيټ شوی واکسين ترلاسه کړي.

COVID-19

د XBB د موخه گرځولو لپاره د اوميکرون يوه فرعي څپه اپډيټ شوي ده.



- ډيري هغه خلک چې په مرکز کې نه دي واکسين شوي، د اپډيټ پاتي کېدو لپاره د Pfizer/Moderna يو ډوز يا د Novavax دوو ډوزونو ته اړتيا لري.
- هغه ماشومان چې له 6 مياشتو څخه تر 4 کلونو پورې عمر لري او تر اوسه يې واکسين شوي نه وي، اوس هم وړانديز کيږي چې دوی د COVID-19 دوه يا درې ډوزونه ترلاسه کړي.

د Moderna، Pfizer او Novavax اپډيټ شوي واکسينونه د لاسرسي وړ دي.

هغه لويان چې 60 کاله يا له هغي زيات عمر لري بايد د خپلو روغتيايي خدمتونو له چمتو کونکي/فارمسيست څخه د RSV واکسين وغواړي.

RSV¹

د تنفسي مجرا وروس (RSV) موخه گرځوي. RSV کولای شي په ماشومانو او لويانو کې د شديدې تنفسي ناروغۍ سبب شي.



ميندواري ميرمني بايد يو ډوز د RSV د موسم پر مهال د 32 او 36 اونيو ترمنځ ترلاسه کړي (ماشوم داسې خوندي کونکی تر لاسه کوي چې له زيرون وروسته د مياشتو لپاره دوام مومي).

1 که چېرې يوه ميندواره ميرمن د RSV واکسين ترلاسه نه کړي، د ماشوم لپاره د RSV د مونوکلونال انټي باډي د يوه ډوز سپارښتنه کيږي. لور خطر لرونکي لويانو/نويو په خاپوړو راغلو ماشومانو ته هم تر 19 مياشتو پورې د يوه ډوز سپارښتنه کيږي.



ALAMEDA COUNTY HEALTH CARE SERVICES AGENCY
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT



د لا زياتو معلوماتو لپاره [covid-19.acgov.org/vaccines](https://www.covid-19.acgov.org/vaccines) ته مراجعه وکړئ

يا QR کوډ سکڼ کړئ: