

COVID-19 치료 및 예방 옵션 알고 있기

이제 COVID-19 치료에 가용한 옵션이 더 많아졌습니다. 대부분의 사람들이 치료를 필요로 하지 않는 반면, 고위험군에 속하는 사람의 경우, 치료를 받음으로써 입원과 사망을 예방할 수 있습니다. 중증의 질환에 대한 위험이 높기에 예방 치료에 관심이 있거나, 또는 COVID-19 검사에 양성 결과를 받은 고위험군에 속하는 자는 본인의 의료 제공자와 상담합니다.



치료는 백신을 대체하지 않습니다. COVID-19로부터 자신을 방어하는데는, 백신 접종이 가장 안전하며 효과적인 방법으로 남아있습니다. 치료는 반드시 일찍 시작되어야 하기에, 검사를 지체하지 마십시오. 다음은 가용한 6 가지의 COVID-19 치료에 대한 정보입니다.

	이부실드 (Evusheld)	팍스로비드 (Paxlovid)	몰누피라비르 (Molnupiravir)	벵텔로비맵 (Bebtelovimab)	렘데시비르 (Remdesivir)
누가 적격한가요?	<ul style="list-style-type: none"> 12세 이상 COVID-19 감염 또는 근래 노출이 없는 자; 또한 다음에 해당하는 자: <ul style="list-style-type: none"> o면역 부전을 지님, o면역계를 낮추는 치료를 받음, 또는 극도의 알레르기 반응으로 인해 백신을 접종 받지 못함. 	<ul style="list-style-type: none"> 12세 이상 중증의 질환에 대한 위험이 높은, COVID-19에 걸린 자. 	<ul style="list-style-type: none"> 18세 이상 중증의 질환에 대한 위험이 높은, COVID-19에 걸린 자. 	<ul style="list-style-type: none"> 12세 이상 중증의 질환에 대한 위험이 높은, COVID-19에 걸린 자. 	<ul style="list-style-type: none"> 3.5킬로 (8파운드) 이상의 성인 및 어린이 입원하지 않았지만 중증의 질환에 대한 위험이 높은, COVID-19에 걸린 자.
언제 반드시 시작되어야 하나요?	COVID-19를 예방하기 위해, 감염 전	증상 발현 시점에서 5일 이내	증상 발현 시점에서 5일 이내	증상 발현 시점에서 7일 이내	증상 발현 시점에서 7일 이내
투여 방법은?	주입	5일간의 경구 투여 알약	5일간의 경구 투여 알약	한 회의 정맥내 주입 (IV)	3일간 하루 한 회의 정맥내 주입 (IV)
어디서 받을 수 있나요?	3일간 하루 한 회의 정맥내 주입 (IV)	자택	자택	의료 시설/인류전 센터	의료 시설/인류전 센터

추가 정보를 얻으려면, 다음을 방문합니다: <https://covid-19.acgov.org/treatment>

