

# Conozca sus opciones de tratamiento y prevención del COVID-19



Ahora hay más opciones de tratamiento disponibles para el COVID-19. Aunque la mayoría de las personas no necesitan tratamiento, los tratamientos pueden prevenir la hospitalización y la muerte para las personas de alto riesgo. Hable con su proveedor de atención médica si está en riesgo de padecer una enfermedad grave y está interesado en la terapia preventiva o si está en alto riesgo y da positivo en la prueba de COVID-19.

Los tratamientos no sustituyen a la vacunación. La vacunación sigue siendo la forma más segura y eficaz de protegerse contra el COVID-19. Los tratamientos deben iniciarse pronto, así que no retrase las pruebas. Aquí tiene información sobre 6 tratamientos disponibles para el COVID-19.

	<b>Evusheld</b>	<b>Paxlovid</b>	<b>Molnupiravir</b>	<b>Bebtelovimab</b>	<b>Remdesivir</b>
<b>¿Quién es elegible?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personas mayores de 12 años.</li> <li>Personas sin infección por COVID-19 o exposición reciente; Y que:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Están inmunocomprometidos,</li> <li>Han recibido un tratamiento que debilita el sistema inmunológico, o</li> <li>No pueden vacunarse debido a una reacción alérgica grave.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personas mayores de 12 años.</li> <li>Personas con COVID-19 que tienen un alto riesgo de enfermedad grave.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personas mayores de 18 años.</li> <li>Personas con COVID-19 que tienen un alto riesgo de enfermedad grave.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personas mayores de 12 años.</li> <li>Personas con COVID-19 que tienen un alto riesgo de enfermedad grave.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos y niños de más de 3,5 kg (8 lbs)</li> <li>Personas con COVID-19 que no están hospitalizadas, pero tienen un alto riesgo de enfermedad grave</li> </ul>
<b>¿Cuándo debe iniciarse?</b>	<b>Antes</b> de la infección para ayudar a prevenir el COVID-19.	En los <b>5 días</b> siguientes al inicio de los síntomas.	En los <b>5 días</b> siguientes al inicio de los síntomas.	En los <b>7 días</b> siguientes al inicio de los síntomas.	En los <b>7 días</b> siguientes al inicio de los síntomas.
<b>¿Cómo se administra?</b>	<b>Inyección</b>	<b>Pastillas</b> tomadas por vía oral durante 5 días.	<b>Pastillas</b> tomadas por vía oral durante 5 días.	Dosis única por <b>infusión intravenosa</b>	Por <b>infusión intravenosa</b> una vez al día <b>durante 3 días</b>
<b>¿Dónde puede administrarse?</b>	<b>Centro de salud/Centro de infusión</b>	<b>Casa</b>	<b>Casa</b>	<b>Centro de salud/Centro de infusión</b>	<b>Centro de salud/Centro de infusión</b>

Para más información, visite: <https://covid-19.acgov.org/treatment>

