

# 瞭解您可選擇的COVID-19治療和預防方案



現在COVID-19的治療有了更多的方案。雖然大多數人不需要治療，但對於高危人群來說，治療可以防止住院和死亡。如果您有患重症的風險並對預防性治療感興趣，或者如果您屬於高風險群體並且COVID-19檢測呈陽性，請諮詢您的醫療服務提供者。

治療不能替代疫苗。接種疫苗仍然是保護您免受COVID-19感染的最安全、最有效的方式。治療必須儘早開始，所以不要拖延檢測。下面介紹了6種現有COVID-19治療方案。

	Evusheld	Paxlovid	Molnupiravir	Bebtelovimab	Remdesivir
哪些人符合條件?	<ul style="list-style-type: none"> <li>年滿12歲</li> <li>無COVID-19感染並且近期沒有接觸過病毒以及：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>免疫功能低下</li> <li>接受過抑制免疫系統的治療, 或</li> <li>由於嚴重的過敏反應，不能接種疫苗。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年滿12歲</li> <li>感染了COVID-19，並且發展為重症的風險較高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年滿18歲</li> <li>感染了COVID-19，並且發展為重症的風險較高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年滿12歲</li> <li>感染了COVID-19，並且發展為重症的風險較高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>成年人及體重超過3.5公斤（8磅）的兒童</li> <li>感染了COVID-19而沒有住院，但是發展為重症的風險較高</li> </ul>
什麼時候必須開始治療?	感染前，有助於預防COVID-19	出現症狀後的5天內	出現症狀後的5天內	出現症狀後的7天內	出現症狀後的7天內
用藥方式?	注射	藥片，口服五天	藥片，口服五天	一次性靜脈輸液 (IV)	每天一次靜脈輸液，持續3天
用藥地點?	醫療機構/輸液中心	居家	居家	醫療機構/輸液中心	醫療機構/輸液中心

瞭解更多資訊，請瀏覽: <https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/know-your-treatment-options-covid-19>

