

از انتخاب‌های تداوی و وقایه از کووید 19 مطلع شوید



در حال حاضر انتخاب‌های بیشتری برای تداوی کووید 19 موجود است. اگرچه اغلب اشخاص به تداوی ضرورت ندارند، اما تداوی می‌تواند از ماندن در شفاخانه و مرگ اشخاص با خطر بلند جلوگیری کنند. اگر در معرض خطر مصاب شدن به نوع شدید مریضی هستید و مایلید تداوی وقایه داشته باشید یا اگر در خطر بلند هستید و تست کووید 19 شما مثبت شده است با ارائه‌دهنده مراقبت صحتی خود صحبت کنید.

تداوی‌ها جایگزین پیچکاری نیستند. همچنان پیچکاری مصئون‌ترین و موثرترین راه حفاظت در برابر کووید 19 است. تداوی باید در مراحل اولیه شروع شوند، پس برای تست تاخیر نکنید. در ذیل معلومات درباره 6 تداوی کووید 19 ارائه می‌شود.

Remdesivir (رمدسیویر)	Bebtelovimab (بتیلوویمب)	Molnupiravir (مولنوپیراویر)	Paxlovid (پکسلووید)	Evusheld (ایووشلد)	چه کسی واجد شرایط هستند؟
• کلانسالان و اطفال با وزن بیشتر از 3.5 کیلوگرام (8 پاوند) • اشخاص مصاب به کووید 19 که بستری نشدند اما در معرض خطر مصاب شدن به نوع شدید مریضی هستند	• اشخاص بالای 12 سال • اشخاص مصاب به کووید 19 که در معرض خطر مصاب شدن به نوع شدید مریضی هستند	• اشخاص بالای 18 سال • اشخاص مصاب به کووید 19 که در معرض خطر مصاب شدن به نوع شدید مریضی هستند	• اشخاص بالای 12 سال • اشخاص مصاب به کووید 19 که در معرض خطر مصاب شدن به نوع شدید مریضی هستند.	• اشخاص بالای 12 سال • اشخاص بدون عفونت کووید 19 یا مواجهه شدن به تازگی و اشخاص که: • سیستم مصئونیت آنها در معرض خطر است، • اخیراً یک تداوی شده‌اند که سیستم مصئونیت آنها را تضعیف کرده است، یا • به دلیل عکس‌العمل‌های حساسیت شدید، پیچکاری شده نمی‌توانند.	
طی 7 روز از شروع علائم	طی 7 روز از شروع علائم	طی 5 روز از شروع علائم	طی 5 روز از شروع علائم	قبل از مصاب شدن به عفونت برای مساعدت به وقایه از کووید 19	چه زمانی باید شروع شود؟
تزریق داخل وریدی (IV) برای 3 روز روزی یک بار	تزریق داخل وریدی (IV) یک بار	قرص در شکل خوراکی برای 5 روز مصرف شود	قرص در شکل خوراکی برای 5 روز مصرف شود	تزریق	طرز انجام چی طور است؟
مراکز مراقبت صحتی / مرکز تزریقات	مراکز مراقبت صحتی / مرکز تزریقات	منزل	منزل	مراکز مراقبت صحتی / مرکز تزریقات	از کجا قابل دریافت است؟

برای معلومات اضافه، به وب سایت ذیل مراجعه کنید: <https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/know-your-treatment-options-covid-19>

