

Conozca sus opciones de tratamiento y prevención del COVID-19



Ahora hay más opciones de tratamiento disponibles para el COVID-19. Aunque la mayoría de las personas no necesitan tratamiento, los tratamientos pueden prevenir la hospitalización y la muerte para las personas de alto riesgo. Hable con su proveedor de atención médica si está en riesgo de padecer una enfermedad grave y está interesado en la terapia preventiva o si está en alto riesgo y da positivo en la prueba de COVID-19.

Los tratamientos no sustituyen a la vacunación. La vacunación sigue siendo la forma más segura y eficaz de protegerse contra el COVID-19. Los tratamientos deben iniciarse pronto, así que no retrase las pruebas. Aquí tiene información sobre 6 tratamientos disponibles para el COVID-19.

	Evusheld	Paxlovid	Molnupiravir	Bebtelovimab	Remdesivir
¿Quién es elegible?	<ul style="list-style-type: none"> • Personas mayores de 12 años. • Personas sin infección por COVID-19 o exposición reciente; Y que: <ul style="list-style-type: none"> • Están inmunocomprometidos, • Han recibido un tratamiento que debilita el sistema inmunológico, o • No pueden vacunarse debido a una reacción alérgica grave. 	<ul style="list-style-type: none"> • Personas mayores de 12 años. • Personas con COVID-19 que tienen un alto riesgo de enfermedad grave. 	<ul style="list-style-type: none"> • Personas mayores de 18 años. • Personas con COVID-19 que tienen un alto riesgo de enfermedad grave. 	<ul style="list-style-type: none"> • Personas mayores de 12 años. • Personas con COVID-19 que tienen un alto riesgo de enfermedad grave. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adultos y niños de más de 3,5 kg (8 lbs) • Personas con COVID-19 que no están hospitalizadas, pero tienen un alto riesgo de enfermedad grave
¿Cuándo debe iniciarse?	Antes de la infección para ayudar a prevenir el COVID-19.	En los 5 días siguientes al inicio de los síntomas.	En los 5 días siguientes al inicio de los síntomas.	En los 7 días siguientes al inicio de los síntomas.	En los 7 días siguientes al inicio de los síntomas.
¿Cómo se administra?	Inyección	Pastillas tomadas por vía oral durante 5 días.	Pastillas tomadas por vía oral durante 5 días.	Dosis única por infusión intravenosa	Por infusión intravenosa una vez al día durante 3 días
¿Dónde puede administrarse?	Centro de salud/Centro de infusión	Casa	Casa	Centro de salud/Centro de infusión	Centro de salud/Centro de infusión

Para más información, visite: <https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/know-your-treatment-options-covid-19>

