



ALAMEDA COUNTY COVID-19 HEALTH EMERGENCY

COUNTY OF ALAMEDA ★ CALIFORNIA

Office of Emergency Services
4985 Broder Blvd, Dublin, CA 94568

Alameda County Health Care Services Agency

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
13 de abril de 2021

Neetu Balram
Public Information Manager
Alameda County Public Health Department
eoc-pio@acgov.org

El Condado de Alameda Suspenderá la Administración de la Vacuna Johnson & Johnson por Recomendaciones del Estado, Federales

Los residentes que recibieron la vacuna Johnson & Johnson en las últimas semanas deben monitorear sus síntomas; quienes recibieron esta vacuna hace más de un mes atrás tienen un riesgo muy bajo de sufrir efectos adversos.

CONDADO DE ALAMEDA, CA – Hoy, los CDC y la FDA anunciaron conjuntamente que, por precaución, las dos agencias recomiendan detener la administración de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson (Janssen). Esta recomendación se hace mientras los CDC y la FDA investigan seis casos reportados en los Estados Unidos de un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo en individuos después de recibir la vacuna Johnson & Johnson. Los seis casos ocurrieron en mujeres de entre 18 y 48 años, los síntomas se presentaron de 6 a 13 días después de la vacunación y se reportó una muerte. Hasta la fecha, se han administrado 6.8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson en los Estados Unidos.

Según las recomendaciones estatales y federales, el Condado de Alameda suspenderá la administración de la vacuna Johnson & Johnson hasta que las autoridades estatales y federales determinen que es seguro comenzar a administrar la vacuna nuevamente.

El Condado de Alameda cancelará las citas de Johnson & Johnson existentes o las reprogramará como citas para una serie de vacunas de dos dosis utilizando la vacuna Moderna o Pfizer, según el suministro disponible. Compartiremos más información a medida que evolucione la situación.

Mientras los efectos adversos de la vacuna Johnson & Johnson parecen ser extremadamente raros, las personas que han recibido la vacuna Johnson & Johnson deben monitorearse para detectar dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas, o dificultad para respirar dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación. Si experimenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato.

Se solicita a los proveedores de atención médica que reporten eventos adversos al sistema Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) en <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>. El episodio actual demuestra la importancia de VAERS y cómo se usa para respaldar la seguridad de las vacunas.

Hasta la fecha, COVID-19 ha provocado directamente la muerte de 559,172 personas en los Estados Unidos y casi 3 millones de personas en todo el mundo. Las vacunas contra el COVID-19 seguras y eficaces seguirán siendo una parte fundamental del esfuerzo para poner fin a la pandemia.

MEDIA
EOC-PIO@acgov.org

PUBLIC
ncov@acgov.org

PHONE
510.268.2101



Alameda County
Health Care Services Agency

