



## ការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម និងអង្គការនានា

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី28 ខែមេសា ឆ្នាំ2021

### គោលបំណងនៃឯកសារនេះ

ឯកសារនេះផ្តល់នូវការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញា និងការប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម និងអង្គការនានា ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបែបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19 គួរអនុវត្តសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ (ដូចជា និយោជិក អ្នកម៉ៅការ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត។ល។) មុនពេលចាប់ផ្តើមវេនការងារនីមួយៗ។

យោងតាម បទដ្ឋានបណ្តោះអាសន្នស្តីពីភាពអាសន្ន ជំងឺ COVID-19 នៃ Cal/OSHA (Cal/OSHA COVID-19 Emergency Temporary Standards) **បុគ្គលិកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់រូប—ទោះជាមាន ឬគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយ—ដែលបានប៉ះពាល់ក្នុងពេលថ្មីជាមួយជំងឺ COVID-19 មិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលកន្លែងធ្វើការឡើយ។** ចំពោះបុគ្គលិកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង ពេញលេញគ្រប់រូប ដែលបានប៉ះពាល់ក្នុងពេលថ្មីជាមួយជំងឺ COVID-19 ដែលគ្មានរោគសញ្ញា គឺមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យ មិនរាប់បញ្ចូលពីកន្លែងធ្វើការឡើយក្រោយពីមានការប៉ះពាល់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមិនអនុញ្ញាតឱ្យចូលកន្លែងធ្វើការ សូមមើលនៅ សំនួរចម្លើយបទដ្ឋានបណ្តោះអាសន្នស្តីពីភាពអាសន្ន ជំងឺ COVID-19 (COVID-19 Emergency Temporary Standards)។

ការត្រួតពិនិត្យទៅធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីនៅដាច់ដោយឡែក ឬធ្វើចត្តាឡីស័ក

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Alameda (Alameda County Public Health Department, ACPHD) អនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រផ្អែកលើពេលវេលា និងរោគសញ្ញារបស់មជ្ឈមណ្ឌលការពារជំងឺឆ្លង (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ដើម្បីកំណត់ពេលវេលាដែលបុគ្គលមានជំងឺ COVID-19 អាចចាកចេញពីការដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ ACPHD **មិនតម្រូវ ហើយក៏មិនលើកទឹកចិត្តចាំបាច់ត្រូវមាន**លទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន ឬវិធានការបញ្ជាក់បន្ថែមផ្សេងទៀតដើម្បីបុគ្គលិកអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញឡើយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើល លិខិតចំហរបស់ខោនធី Alameda ផ្តល់នូវនិយោជកពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ និង គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែករបស់ CDC។

### ការត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិក

បុគ្គលទាំងអស់ (ដូចជា និយោជិក អ្នកម៉ៅការ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត។ល។) គួរធ្វើការពិនិត្យរោគសញ្ញា COVID-19

និងសិក្សាភាពដោយខ្លួនឯងនៅមុនពេលចាប់ផ្តើមវេនការងារនីមួយៗ។ បុគ្គលដែលមានរោគសញ្ញា**មិនគួរអនុញ្ញាតឱ្យចូលកន្លែងធ្វើការឡើយ។** សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល គោលការណ៍ណែនាំអំពីស្វ័យគម្លាតជំងឺ COVID-19 សម្រាប់បុគ្គលិក។

### សំណួរត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃ

ការពិនិត្យរោគសញ្ញា និងការប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 គួរអនុវត្ត**បន្ថែមលើ**វិធានការទប់ស្កាត់ផ្សេងៗទៀតដូចជា ការលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ ការពាក់ម៉ាស់ ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព 6 ហ្វីត (feet) ពីអ្នកដទៃ ការបង្កើនខ្យល់អាកាសចេញចូល និងការបង្កើតរបាំងសុវត្ថិភាពដោយប្រើសារធាតុដូចជា Plexiglass ដើម្បីកាត់បន្ថយការចម្លង COVID-19 នៅពេលដែលការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពមិនអាចអនុវត្តបាន។

សំណួរខាងក្រោមគួរសួរទៅលើបុគ្គលិកទាំងអស់ មុនពេលចាប់ផ្តើមវេនការងារនីមួយៗ។ ប្រសិនបើមានចម្លើយ បាទ/ចាស ចំពោះសំណួរណាមួយខាងក្រោម ត្រូវបុគ្គលិកនោះទៅផ្ទះដើម្បីអនុវត្តតាមវិធានការដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែក/ចត្តាឡីស័ក។



**សំណួរត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញា និងការប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19**

នៅក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ តើអ្នកត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមាន (ដូចជា ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន) ជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ?	<input type="checkbox"/> បាទ/ចាស <input type="checkbox"/> ទេ
នៅក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃចុងក្រោយ តើអ្នកបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់* ជាមួយដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន និង/ឬត្រូវបានដាក់នៅដាច់ដោយឡែកដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ?	<input type="checkbox"/> បាទ/ចាស <input type="checkbox"/> ទេ
នៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងចុងក្រោយ តើអ្នកមានរោគសញ្ញាណាមួយដែលមិនអាចពន្យល់បានក្រៅតែពីករណីអាចមានជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ?	<input type="checkbox"/> បាទ/ចាស <input type="checkbox"/> ទេ
<input type="checkbox"/> ក្រុនក្តៅ រងារ ឬញាក់/ញើរ <input type="checkbox"/> ក្អក <input type="checkbox"/> ឈឺបំពង់ក <input type="checkbox"/> ដកដង្ហើមខ្លីៗ ពិបាកដកដង្ហើម <input type="checkbox"/> មានអារម្មណ៍ខ្សោយ ឬអស់កម្លាំងខុសពីធម្មតា <input type="checkbox"/> លែងដឹងរសជាតិ ឬក្លិន <input type="checkbox"/> ឈឺសាច់ដុំ <input type="checkbox"/> ឈឺក្បាល <input type="checkbox"/> ហឿនសំបោរ <input type="checkbox"/> គឺងច្រមុះ <input type="checkbox"/> រាករូស <input type="checkbox"/> រមួលពោះចងក្អក និង/ឬក្អកចង្ហោរ	

\*អ្នកប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធត្រូវបានកំណត់ថាជាបុគ្គលដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 6 ហ្វីត (feet) រយៈពេលសរុបចាប់ពី 15 នាទីឡើងទៅ នៅក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃមុនចាប់ផ្តើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ដោយមិនគិតថាតើអ្នកប៉ះពាល់នោះមានពាក់ម៉ាស់ ឬក៏អត់ឡើយ។

**ការពិចារណាសម្រាប់សំណួរត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19**

**តើនរណាខ្លះនឹងត្រូវពិនិត្យរោគសញ្ញា និងការប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19?**

ចូរកំណត់អ្នកដែលត្រូវសួរអំពីរោគសញ្ញា COVID-19 និងការប៉ះពាល់ជាមួយជំងឺ COVID-19៖ តែបុគ្គលិក ឬមនុស្សទាំងអស់ដែលចូលក្នុងអគារ?

**តើនរណាដែលនឹងសួរសំណួរអំពីការពិនិត្យជំងឺ COVID-19?**

ចូរពិចារណាអំពីវេទិកាឌីជីថលសម្រាប់ការប្រមូលព័ត៌មានអំពីការពិនិត្យជំងឺ COVID-19។ ប្រសិនបើពុំអាចអនុវត្តវេទិកាឌីជីថលទេ ត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកដែលសួរអំពីការត្រួតពិនិត្យ។ ការពិចារណាបន្ថែមរួមមានដូចខាងក្រោម៖

- ពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីសួរបុគ្គលិកអំពីសំណួរត្រួតពិនិត្យអាចបង្កើតជាឧបសគ្គនៅច្រកចូលដែលធ្វើឱ្យការចាប់ផ្តើមការងារមានភាពយឺតយ៉ាវ ហើយអាចបង្កឱ្យមានមនុស្សឈរជាជួរវែង។
- យោងតាម [បទបញ្ញត្តិការពាក់ម៉ាស់ California](#) បុគ្គលដែលធ្វើការពិនិត្យជំងឺ COVID-19 គួរពាក់ម៉ាស់ឬប្រាំដុំគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ជាពិសេសនៅពេលទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ។

**តើការត្រួតពិនិត្យនឹងធ្វើឡើងនៅកន្លែងណា?**

ចូរកំណត់កន្លែងសម្រាប់អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ។

- ការពិនិត្យត្រូវធ្វើឡើងនៅមុនពេលបុគ្គលចូលក្នុងអគារ ឬចូលក្លាយពិនិត្យភ្លាម។
- ប្រសិនបើសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មាត់ គួររៀបចំកន្លែងត្រួតពិនិត្យដើម្បីរកក្សាភាពសម្ងាត់។
- កន្លែងត្រួតពិនិត្យត្រូវមានទំហំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យបុគ្គលម្នាក់អាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព 6 ហ្វីត (feet)



នៅពេលរង់ចាំការត្រួតពិនិត្យ។ ត្រូវដាក់សញ្ញាសម្គាល់នៅកម្រាលចន្លោះពីគ្នា 6 ហ្វីត (feet)  
ដើម្បីបង្ហាញកន្លែងសមរម្យសម្រាប់ឈរជាជួររង់ចាំចូលត្រួតពិនិត្យ។

- អគារអាចនឹងត្រូវបិទច្រកចូលមួយចំនួនដើម្បីការពារកុំឱ្យមនុស្សចូលដោយគ្មានការពិនិត្យ។

**ការពិចារណាលើសុវត្ថិភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ និងការតាមដានបន្ថែម៖**

- បុគ្គលទាំងអស់គួរពាក់របាំងមុខ ឬម៉ាសនៅក្នុងពេលវាយតម្លៃត្រួតពិនិត្យ។
- យោងតាមសេចក្តីណែនាំរដ្ឋ California បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវពាក់របាំងមុខ នៅពេលចូលរួមការសួរសុំល្អិតត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់។ បុគ្គលដែលគ្មានម៉ាសនឹងត្រូវផ្តល់ជូននូវម៉ាសមួយ ទៅតាមបរិមាណស្តុកដែលមាន។ របាំងមុខអាចជាក្រចក់ ឬក្រណាត់ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា។
- ត្រូវយកវត្ថុដែលប្រើប្រាស់រួមគ្នាចេញ។ ឧទាហរណ៍ មិនត្រូវប្រើបិទប្រើប្រាស់គ្នា។ ចំពោះវត្ថុដែលត្រូវប្រើប្រាស់គ្នា ត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅក្រោយពេលប្រើប្រាស់មួយលើក។

**ការពិចារណាសម្រាប់វាស់កម្ដៅ**

**ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មភាគច្រើនត្រូវបានណែនាំឱ្យវាស់កម្ដៅឡើយ។**

ការពិនិត្យសិក្សាភាពមិនត្រូវអនុវត្តជំនួសវិធានការពិនិត្យផ្សេងទៀតឡើយ ដូចជា ការពិនិត្យរោគសញ្ញា និងការវាយតម្លៃខ្លួនឯងសម្រាប់ការប៉ះពាល់ជាមួយជំងឺ COVID-19 ដែលអាចមាន ដោយរក្សាកម្លាត 6 ហ្វីត (feet) ពីអ្នកដទៃ និងដាក់របាំងខណ្ឌ ដូចជា បង្អួចកញ្ចក់ ឬផ្លាស្ទិក ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ ដែលមិនអាចរក្សាកម្លាតសុវត្ថិភាព 6 ហ្វីត ពីអ្នកដទៃ។

សម្គាល់៖ ត្រូវពិនិត្យរកសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ជាមុន។ បុគ្គលដែលឆ្លើយ បាទ/ចាស ចំពោះសំណួរត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃខ្លួនឯង មិនត្រូវការវាស់កម្ដៅឡើយ ហើយគួរស្នាក់នៅ/ទៅផ្ទះ។

ទោះបីក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មភាគច្រើនមិនត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើការវាស់កម្ដៅ មជ្ឈមណ្ឌលការពារជំងឺឆ្លង (CDC) សូមណែនាំឱ្យធ្វើការសួរសុំល្អិតត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ផង និងធ្វើការវាស់កម្ដៅផង នៅពេលមកដល់សម្រាប់ក្រុមដូចខាងក្រោម៖

- បុគ្គលិកដែលចូលធ្វើការនៅមណ្ឌលថែទាំសុខភាព រួមមាន ការថែទាំជំនាញ និងការថែទាំរយៈពេលវែងជាដើមសម្រាប់ការណែនាំបន្ថែមសូមមើលឯកសារអំពីមណ្ឌលថែទាំរយៈពេលវែងខោនធី Alameda។
- បុគ្គលិក ភ្ញៀវ និងបុគ្គលដែលជាប់នៅមណ្ឌលកែប្រែ/មន្ទីរឃុំឃាំង។
- បុគ្គលិកផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបន្តធ្វើការបន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលដែលសង្ស័យ ឬត្រូវបានបញ្ជាក់ថា មានជំងឺ COVID-19 ដែលរួមមាន៖
  - មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធ រដ្ឋ និងក្នុងមូលដ្ឋាន
  - បុគ្គលិកផ្នែកសេវាអភិថិជន 911
  - បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌល Fusion Center
  - អ្នកឆ្លើយតបសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន
  - បុគ្គលបោសសម្អាតអគារ ឬបុគ្គលថែទាំ



- បុគ្គល រួមទាំងអ្នកលក់ជាប់កិច្ចសន្យា ផ្នែកអាហារ និងកសិកម្ម ការផលិតសំខាន់ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ការដឹកជញ្ជូន ថាមពល និងអគាររដ្ឋាភិបាល។
- អភិវឌ្ឍន៍ដែលទៅដល់ទីជម្រកសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសំបែង។
- កុមារដែលទៅចូលរួមកម្មវិធីថែទាំកុមារ រួមទាំងកម្មវិធីមុនមត្តេយ្យសិក្សា (pre-kindergarten) ផងដែរ។  
គោលការណ៍ណែនាំ CDC ចែងថា កម្មវិធីថែទាំកុមារអាចអនុញ្ញាតឱ្យឪពុកម្តាយវាស់ សិក្សាភាពកូនដោយប្រើប្រដាសវាស់កម្តៅមុនពេលទៅដល់ បន្ទាប់មកត្រូវវាយការណ៍អំពី សិក្សាភាពទៅដល់មណ្ឌលថែទាំកុមារ។ កម្មវិធីថែទាំកុមាររួមមានដូចខាងក្រោម៖
  - កម្មវិធីថែទាំកុមារសម្រាប់គ្រួសារ (ដូចជា សេវាថែទាំកុមារតាមផ្ទះ)
  - កម្មវិធី Pre-K (ដូចជា មុនមត្តេយ្យសិក្សា) នៅសាលារដ្ឋ និងឯកជន។
  - កម្មវិធី Head Start and Early Head Start
  - មណ្ឌលថែទាំកុមារឯកជន

**តើកន្លែងធ្វើការផ្សេងទៀតដែលមិនបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីខាងលើ ត្រូវធ្វើការវាស់កម្តៅរបស់បុគ្គលិក និង/ឬអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលមកដល់ទីតាំងដែរឬទេ?**

នៅពេលនេះ មន្ទីរសុខភាពសាធារណៈ Alameda County (Alameda County Public Health Department) មិនណែនាំឱ្យកន្លែងធ្វើការទាំងអស់ធ្វើការវាស់កម្តៅបុគ្គលិកដើម្បីជាមធ្យោបាយត្រួតពិនិត្យរកការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចមានឡើយ។ សូមបញ្ជាក់ថា អត្ថប្រយោជន៍នៃការសួរអំពីរោគសញ្ញារួមជាមួយនឹងការវាស់ជំនាញការប្រសើរបំផុតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

- នៅពេលបុគ្គលិកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាច្រើនបានប៉ះពាល់ជាមួយជំងឺ COVID-19 ហើយការតម្រូវឱ្យបុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ទាំងអស់ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក 14 ថ្ងៃ នឹងបណ្តាលឱ្យខ្វះបុគ្គលិក ក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើន។
- បរិយាកាសបិទជិតដែលជំងឺ COVID-19 អាចរីករាលដាលឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើមាន ដូចជា មណ្ឌលថែទាំ ពន្ធនាគារ និងមន្ទីរឃុំឃាំង។
- ស្ថានភាពដែលវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះ ដូចជា ការរក្សាគម្លាត 6 ហ្វីត (feet) និងការផ្តល់ម៉ាស់/របាំងមុខដល់មនុស្សទាំងអស់មិនអាចធ្វើបាន ដូចជាកម្មវិធីថែទាំកុមារជាដើម។
- ទីកន្លែងផ្តល់សេវាដល់បុគ្គលដែលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នឹងជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ (ដូចជា មន្ទីរពេទ្យ ភ្លឺនិក មណ្ឌលថែទាំជាដើម)។

**តើកន្លែងធ្វើការត្រូវត្រួតពិនិត្យទុកព័ត៌មានស្តីពីការពិនិត្យសិក្សាភាព និងរោគសញ្ញាបុគ្គលិកនៅក្នុងឯកសារដែរឬទេ?**

កន្លែងធ្វើការអាចសម្រេចថា តើខ្លួនចង់រក្សាទុកព័ត៌មានស្តីពីការពិនិត្យសិក្សាភាព និងរោគសញ្ញាបុគ្គលិកនៅក្នុងឯកសារដែរឬទេ។ ប្រសិនបើកន្លែងធ្វើការជ្រើសរើសរក្សាទុកឯកសារទាំងនេះ នោះ Cal/OSHA តម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរក្សាទុកឯកសារទាំងនេះរយៈពេល 30 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកចាកចេញពីអង្គការ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើល [Cal/OSHA: ស្តង់ដារស្តីពីការចូលមើលកំណត់ត្រាស្តីពីការប៉ះពាល់ និងកំណត់ត្រា វេជ្ជសាស្ត្ររបស់បុគ្គលិក \(8 CCR 3204\)](#)។



ការពិចារណាសម្រាប់ការរៀបចំកន្លែងពិនិត្យសិក្សាស្ថិតភាព

- ត្រូវសម្រេចលើកត្តាទាំងបីស្របទៅតាមផ្នែក [សំណួរពិចារណាសម្រាប់ការពិនិត្យជំងឺ COVID-19](#) នៃឯកសារនេះ៖ តើនរណាដែលត្រូវពិនិត្យរករោគសញ្ញា និងការប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19? តើការត្រួតពិនិត្យត្រូវធ្វើនៅកន្លែងណា?
- ត្រូវដំឡើងរបាំងខណ្ឌ ដូចជា បង្អួចកញ្ចក់ ឬជ្រាស្លឹកថ្លា នៅចន្លោះបុគ្គលដែលចូលក្នុងអគារ និងអ្នកដែលធ្វើការវាស់កម្ដៅ។
  - ទីកន្លែងត្រូវរៀបចំក្នុងចន្លោះយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត (feet) ពីគ្នា និងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលអាចរក្សាការសម្ងាត់របស់បុគ្គលដែលត្រូវពិនិត្យ។
  - ប្រសិនបើមិនអាចដាក់របាំងខណ្ឌទេ នោះបុគ្គលដែលវាស់កម្ដៅត្រូវពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន (PPE) ដូចជា ម៉ាស ឧបករណ៍ការពារភ្នែក (វ៉ែនតា ឬរបាំងមុខសម្រាប់ប្រើតែម្ដងបោះចោល ដែលអាចបិទបាំងផ្នែកខាងមុខ និងចំហៀងផ្ទៃមុខ) និងស្រោមដៃសម្រាប់ប្រើរួចបោះចោល។ ប៉ុន្តែ PPE តែមួយមុខមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចការដាក់របាំងខណ្ឌឡើយ។ ក្រៅពីនេះ បុគ្គលិកត្រូវទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ PPE។
- នៅពេលជ្រើសរើសប្រភេទប្រដាប់វាស់កម្ដៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់៖
  - សម្រាប់ប្រដាប់វាស់កម្ដៅគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ប្រដាប់វាស់កម្ដៅដែលមានគុណភាព កាន់តែខ្ពស់នឹងផ្តល់លទ្ធផលវាស់កាន់តែសុក្រឹត។ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត។
  - នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ Alameda County សូមណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ ប្រដាប់វាស់កម្ដៅពិចម្ងាយ (infrared) ដោយមានចំណុចត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដូចខាងក្រោម៖
    - ប្រដាប់វាស់កម្ដៅពិចម្ងាយងាយនឹងផ្តល់លទ្ធផលសិក្សាស្ថិតភាពទាបជាងប្រដាប់វាស់កម្ដៅដាក់ ក្នុងមាត់ ជាពិសេសនៅពេលប្រើប្រាស់នៅខាងក្រៅអគារ។
  - ប្រសិនបើប្រើប្រដាប់វាស់កម្ដៅដាក់ក្នុងមាត់ នោះការផឹកភេសជ្ជៈ និងសារធាតុរាវផ្សេងៗនៅក្នុងរយៈពេល 30 នាទី អាចធ្វើឱ្យលទ្ធផលវាស់មិនត្រឹមត្រូវ។

នីតិវិធីសម្រាប់វាស់កម្ដៅ

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ Alameda County ចាត់ទុកបុគ្គលដែលមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី 100 ដឺក្រេ F (37.8 C) ឡើងទៅ ជាបុគ្គលដែលមានជំងឺគ្រុនក្តៅ (ដូចជា មានជំងឺក្តៅខ្លួន ជាដើម)។ **បុគ្គលដែលមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី 100 ដឺក្រេ F (37.8 C) ឡើងទៅគួរបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗ ឬហាមមិនឱ្យមកកន្លែងធ្វើការ។** សីតុណ្ហភាព 96°F (35.6°C) ចុះក្រោមគួរធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធានាថា អំណានមានភាពច្បាស់លាស់។

សម្គាល់៖ បុគ្គលដែលមានអាការៈគ្រុនក្តៅ ឬរោគសញ្ញា COVID-19 ផ្សេងទៀតគួរចាកចេញពីកន្លែងធ្វើការ ភ្លាមៗ ត្រូវជូនដំណឹងដល់ប្រធាន និងទាក់ទងទៅអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំបឋមរបស់គាត់ ឬមណ្ឌលសុខភាព។ កុមារដែលចូលរួមកម្មវិធីថែទាំកុមារមិនគួរអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមនៅពេលមានរោគសញ្ញាឡើយ។ សម្រាប់ក្រុមផ្សេងទៀត សូមមើលពិធីសាររបស់អង្គការ។



**ការណែនាំសម្រាប់ការវាស់កម្ដៅនៅពេលមានរបាំងខណ្ឌ (វិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើ)៖**

- នៅពេលទៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យ ត្រូវលាងដៃ និងពាក់ស្រោមដៃសម្រាប់ប្រើរួចបោះចោលជានិច្ច។ នៅពេលប្រើប្រាស់ប្រដាប់វាស់កម្ដៅព័ទ្ធជាមួយ (infra-red) ឬប្រដាប់វាស់កម្ដៅសៀតផ្កា នោះមិនចាំបាច់ប្តូរស្រោមដៃនៅមុនពេលវាស់កម្ដៅពីម្នាក់ទៅម្នាក់ឡើយ ប្រសិនបើបុគ្គលដែលធ្វើការវាស់កម្ដៅមិនប៉ះពាល់បុគ្គលដែលត្រូវវាស់កម្ដៅ។
- នៅពេលធ្វើការវាស់កម្ដៅ ត្រូវឈរពីចម្ងាយរបាំងខណ្ឌ ដូចជាបង្អួចកញ្ចក់ ឬរបាំងផ្លាស្ទិក ដើម្បីការពារមុខរបស់អ្នកមិនឱ្យប៉ះជាមួយតំណក់ទឹកផ្លូវដង្ហើមដែលអាចកើតឡើងនៅពេលអតិថិជនកណ្តាស់ ក្អក ឬនិយាយជាដើម។ នៅពេលនៅជុំវិញរបាំងខណ្ឌ បុគ្គលដែលវាស់កម្ដៅត្រូវពិនិត្យឱ្យច្បាស់ថា មុខរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅពីចម្ងាយរបាំងនៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។

**ការណែនាំសម្រាប់ការវាស់កម្ដៅនៅពេលមាន PPE ប៉ុន្តែគ្មានរបាំងខណ្ឌ៖**

- នៅពេលទៅដល់ ត្រូវលាងដៃ និងពាក់ម៉ាស់ ឧបករណ៍ការពារភ្នែក (វ៉ែនតា ឬរបាំងមុខប្រើរួចសម្រាប់បោះចោល) និងស្រោមដៃសម្រាប់ប្រើរួចបោះចោលចំនួនមួយគូ។
  - ត្រូវអនុវត្តតាមអនុសាសន៍បច្ចុប្បន្នរបស់ CDC សម្រាប់ម៉ាស់ និងឧបករណ៍ការពារភ្នែក។
  - ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អគារអំពីរបៀបពាក់ និងដោះ PPE ដោយសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើគ្មានគោលការណ៍ណែនាំទេ សូមមើល លំដាប់លំដោយតាមការណែនាំរបស់ [CDC សម្រាប់ការពាក់ និងដោះ PPE](#)។
  - វ៉ែនតាមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាឧបករណ៍ការពារភ្នែកគ្រប់គ្រាន់ឡើយ ដោយសារវាមិនគ្របដណ្តប់មុខ។ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារភ្នែក ដូចជាវ៉ែនតា ឬរបាំងមុខសម្រាប់ប្រើរួចបោះចោលដែលគ្របលើមុខពេញ និងចំហៀងមុខ គឺជាវិធីការពារដែលមានការណែនាំខ្ពស់បំផុត។
  - ត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូ និងទឹករយៈពេល 20 វិនាទី។ ប្រសិនបើគ្មានសាប៊ូ និងទឹកទេ ត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានជាងអាល់កុលយ៉ាងតិច 60%។ ប្រសិនបើដៃមើលទៅ មានស្នាមប្រឡាក់ ត្រូវប្រើប្រាស់សាប៊ូ និងទឹកមុនពេលប្រើប្រាស់ទឹកអាល់កុលលាងដៃ។
- ត្រូវអនុវត្តការវាស់កម្ដៅ។
  - ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពក្រោម 96°F (35.6°C) ត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ។
  - ពេលប្រើប្រាស់ប្រដាប់វាស់កម្ដៅព័ទ្ធជាមួយ (infra-red) ឬប្រដាប់វាស់កម្ដៅសៀតផ្កា នោះអ្នកមិនចាំបាច់ប៉ះបុគ្គលដែលត្រូវពិនិត្យ អ្នកមិនចាំបាច់ប្តូរស្រោមដៃមុនពេលពិនិត្យបន្ទាប់ទៀតឡើយ។
  - ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ប្រដាប់វាស់កម្ដៅដាក់ក្នុងមាត់ ត្រូវធ្វើការលាងសម្អាតដោយប្រើក្រណាត់ជូតអាល់កុល (ឬអាល់កុល isopropyl ឬដុំសំឡី) នៅចន្លោះអតិថិជនម្នាក់ៗ។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រដាប់ជូតឡើងវិញដរាបណាវានៅតែសើម។



- ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ប្រដាប់វាស់កម្ដៅដាក់ក្នុងមាត់ ត្រូវប្រើស្រោមដៃស្អាតមួយគូសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ ហើយត្រូវសម្អាតប្រដាប់វាស់កម្ដៅឱ្យបានស្អាតល្អនៅចន្លោះពេលត្រួតពិនិត្យនីមួយៗ។ ប្រដាប់វាស់កម្ដៅដាក់ក្នុងមាត់ដែលមានគម្របសម្រាប់ប្រើរួចបោះចោល ក៏អាចយកមកប្រើបានផងដែរ។
- នៅពេលបញ្ចប់វេន ឬនៅពេលចាកចេញពីកន្លែងពិនិត្យ (ដូចជាសម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់) ត្រូវដោះយក PPE ទៅបោះចោល រួចលាងដៃដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

**លក្ខខណ្ឌដែលអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលវាស់កម្ដៅ៖**

- សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបរិយាកាស កម្ដៅព្រះអាទិត្យ និងខ្យល់អាចធ្វើឱ្យលទ្ធផលវាស់កម្ដៅមិនត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងប្រដាប់វាស់កម្ដៅវាស់នៅថ្ងាស (សៀកផ្កា) ឬ infrared នៅពេលប្រើនៅខាងក្រៅអគារ។
- ការទទួលបានអាហារ និង/ឬភេសជ្ជៈក្ដៅ ឬត្រជាក់នៅក្នុងរយៈពេលអាចធ្វើឱ្យលទ្ធផលវាស់កម្ដៅមិនត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងប្រដាប់វាស់កម្ដៅដាក់ក្នុងមាត់។
- ការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅក្នុងរយៈពេល 30 នាទីមុនពេលវាស់ អាចធ្វើឱ្យកម្ដៅកើនឡើងជាមួយនឹងគ្រប់ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅទាំងអស់។
- ការប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ និងថ្នាំបន្ថយកម្ដៅ ដូចជា aspirin, acetaminophen (ដូចជា Tylenol), ibuprofen (ដូចជា Motrin or Advil) ឬ naproxen (ដូចជា Aleve) អាចធ្វើឱ្យលទ្ធផលវាស់ មិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់បុគ្គលដែលនឹងមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្ដៅ។
- មនុស្សចាស់ និង/ឬបុគ្គលដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមិនសូវរឹងមាំមិនអាចមានកម្ដៅខ្ពស់ខ្លាំងទេ។
- អ្នកជំងឺដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពត្រជាក់អាចមានកម្ដៅខ្ពស់ទាបទោះបីជាមានជំងឺឆ្លងក៏ដោយ។ ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅនឹងបង្ហាញកម្ដៅខ្ពស់ពិតប្រាកដ ប៉ុន្តែមិនអាចកើនឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការមានជំងឺឆ្លងឡើយ។ សូមដោះ PPE យកទៅបោះចោល រួចលាងដៃដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។