


علائم جدید در کودکی که قبلاً به کووید-19 مبتلا بوده است

کودک من از کووید-19 بهبود یافت یا در گذشتہ سارس-کوو-2 او مثبت بود. آیا او باید دوباره برای علائم جدیدی (SARS-CoV-2) که میتواند ناشی از کووید-19 باشد، آزمایش شود؟

- این بستگی به این دارد که چه مدت از بیمار بودن یا مثبت بودن فرزند شما گذشتہ است و ارائه دهنده خدمات بهداشتی شما چه می گوید.
- افراد می توانند دوباره آلوده شوند. شواهد نشان می دهد که عفونت مجدد می تواند 90+ روز پس از علائم اولیه یا آزمایش مثبتاتفاق بیفتد.

- اگر کمتر از 90 روز از اولین علائم کووید-19 یا آزمایش مثبت گذشتہ باشد، سرایت مجدد آن بسیار بعید است. آزمایش کووید-19 فقط باید در صورتی انجام شود که ارائه دهنده خدمات بهداشتی شما آن را توصیه کند.

- برای بازگشت به مدرسه به ACPHD آزمایش یا یادداشتارائه دهنده خدمات بهداشتی شما احتیاج ندارد.



- اگر بیشتر از 90 روز از اولین علائم کووید-19 یا آزمایش مثبت گذشتہ باشد، علاوه بر آزمایش مجدد، باید تشخیص دیگری نیز در نظر گرفته شود. بهتر است با ارائه دهنده خدمات بهداشتی کودک خود صحبت کنید.

