

# ដឹងពីជម្រើសនៃការព្យាបាលនិងការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) របស់អ្នក

បច្ចុប្បន្ននេះ ជម្រើសនៃការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) មានកាន់ច្រើន។ នៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនត្រូវការការព្យាបាល ការព្យាបាលអាចបង្ការការចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ចំពោះបុគ្គលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។ សូមប្រឹក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងចាប់អារម្មណ៍លើការព្យាបាលបង្ការ ឬប្រសិនបើអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់ និង តេស្តវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19)។



ការព្យាបាលមិនមែនធ្វើឡើងជំនួសឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែជាមធ្យោបាយដ៏មានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីការពារអ្នកពីជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19)។ ការព្យាបាលត្រូវតែធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់ ដូច្នេះសូមកុំពន្យារពេលលើការធ្វើតេស្ត។ នេះជាព័ត៌មានស្តីពីការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ចំនួន៦។

	<b>Evusheld</b>	<b>Paxlovid</b>	<b>Molnupiravir</b>	<b>Bebtelovimab</b>	<b>Remdesivir</b>
<b>តើអ្នកណាមានសិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាល?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>អាយុ ១២ ឆ្នាំឡើងទៅ</li> <li>បុគ្គលដែលមិន ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ឬ ទើបតែមានការប៉ះពាល់ថ្មី។ និង បុគ្គលដែល៖               <ul style="list-style-type: none"> <li>មានប្រព័ន្ធភាពសុំចុះខ្សោយ</li> <li>ទទួលបានការព្យាបាលដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពសុំចុះខ្សោយ ឬ</li> <li>មិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានដោយសារមានប្រតិកម្មអាល់ឡឺហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ។</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>អាយុ ១២ ឆ្នាំឡើងទៅ</li> <li>បុគ្គលដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>អាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ</li> <li>បុគ្គលដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>អាយុ ១២ ឆ្នាំឡើងទៅ</li> <li>បុគ្គលដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>មនុស្សពេញវ័យ និង កុមារដែលមានទម្ងន់លើសពី ៣.៥ គីឡូក្រាម (៨ផោន)</li> <li>បុគ្គលដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ដែលមិនបានចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ប៉ុន្តែមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ</li> </ul>
<b>តើការព្យាបាលត្រូវចាប់ផ្តើមនៅពេលណា?</b>	មុនពេលឆ្លងដើម្បីជួយបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19)	ក្នុងរយៈពេល៥ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃផ្តើមចេញរោគសញ្ញា	ក្នុងរយៈពេល៥ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃផ្តើមចេញរោគសញ្ញា	ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃផ្តើមចេញរោគសញ្ញា	ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃផ្តើមចេញរោគសញ្ញា
<b>តើការព្យាបាលធ្វើឡើងតាមវិធីណា?</b>	ការចាក់ថ្នាំ	លេបថ្នាំសម្រាប់រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ។	លេបថ្នាំសម្រាប់រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ។	ចាក់ថ្នាំតាមសរសៃ (IV) ចំនួនមួយដង	ចាក់ថ្នាំតាមសរសៃ (IV) ចំនួនមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេល៣ថ្ងៃ
<b>តើការព្យាបាលអាចធ្វើឡើងនៅទីណា?</b>	មណ្ឌលថែទាំសុខភាព / មជ្ឈមណ្ឌលចាក់ថ្នាំ	ផ្ទះ	ផ្ទះ	មណ្ឌលថែទាំសុខភាព / មជ្ឈមណ្ឌលចាក់ថ្នាំ	មណ្ឌលថែទាំសុខភាព / មជ្ឈមណ្ឌលចាក់ថ្នាំ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ <https://covid-19.acgov.org/treatment>