


أجر الاختبار كشخص محترف

إليك كيفية قراءة نتائجك


قد تظهر النتائج الإيجابية غامقة أو باهتة كما هو موضح في الأمثلة أدناه. يشير أي ظل لخط الاختبار باللون الوردى والأحمر إلى وجود نتيجة إيجابية.



خط الاختبار بلون غامق



خط الاختبار بلون باهت



ستعرض النتائج السلبية فقط خط التحكم.



خط التحكم




لا يوجد خط اختبار

يجب إعطاء علاجات كوفيد-19 عن طريق الفم مثل عقار باكسلوفيد في غضون 5 أيام من بدء ظهور الأعراض. من الأهمية بمكان إجراء الاختبار بمجرد ظهور الأعراض. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون اختبارات المستضد سلبية حتى إذا كنت مصابًا بفيروس كوفيد، لذا احرص على الخضوع للعزل والاختبار مرة أخرى بعد مرور فترة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة.

يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أو الذين يعانون من حالة طبية أو حصلوا على جميع الجرعات اللازمة لتطعيمات كوفيد أن يفكروا في إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) إذا كان اختبار المستضد سلبياً. من المحتمل أن تكتشف اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) وجود عدوى ميكرواً، لذا ستعرف في أقرب وقت أنك مصاب وستخضع للعلاج.



لا يوجد خط تحكم أو لا توجد خطوط



تظهر النتائج غير الصالحة عندما لا يتم عرض أي خط تحكم أو أي خطوط تمامًا. هذا يعني أنك تحتاج إلى إجراء اختبار آخر.

