

مانند یک پرو تست کنید

در اینجا شیوه خواندن نتایج شما آورده شده است


نتایج مثبت ممکن است همانطور که در مثال های ذیل نشان داده شده است به صورت پررنگ یا کم رنگ ظاهر شوند. هر سایه ای از خط تست گلابی تا سرخ نشان دهنده یک نتیجه مثبت است.



خط تست پررنگ



خط تست کم رنگ



نتایج منفی فقط یک خط کنترل را نشان می دهد.



خط کنترل



بدون خط تست




تداوی های خوراکی کووید-19 مانند Paxlovid باید ظرف 5 روز پس از شروع علائم انجام شوند. مهم است که به محض بروز علائم آزمایش کنید. گاهی اوقات حتی در صورت ابتلا به کووید، آزمایش انتیژن می تواند منفی باشد، بنابراین مطمئن شوید که 24 تا 48 ساعت بعد آن را خود را جدا کرده و دوباره آزمایش کنید.

افرادی که بیش از 50 سال سن دارند و یا دارای شرایط مشکلات صحتی دارند یا در مورد واکسیناسیون کووید به روز نیستند، در صورت منفی بودن آزمایش انتیژن، باید آزمایش PCR را در نظر بگیرند. تست های PCR بیشتر احتمال دارد عفونت را زود تشخیص دهند، بنابراین زودتر متوجه می شوید که مثبت هستید و می توانید درمان شوید.



بدون خط کنترل
یا بدون خط



نتایج نامعتبر زمانی اتفاق می افتد که خط کنترلی وجود نداشته باشد یا اصلاً خطی وجود نداشته باشد.

به این معنی است که شما باید یک آزمایش دیگر انجام دهید.

