

Cuándo volver a realizar la prueba de COVID-19

¿Ha dado negativo en la prueba de una auto prueba a pesar de tener síntomas de COVID-19?

A veces, las pruebas de antígenos pueden ser negativas incluso si tiene COVID. Por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones de aislamiento y volver a realizar la prueba de 24 a 48 horas después.



Nota importante: Las personas mayores de 50 años **O** que tienen una afección médica **O** que no están al día con las vacunas COVID deben considerar la prueba de PCR si la prueba de antígenos es negativa. Es más probable que las pruebas de PCR detecten la infección temprano, por lo que sabrá antes que es positivo y puede recibir tratamiento.

5 CONSEJOS PARA MANTENER A LOS SERES QUERIDOS SEGUROS ESTA TEMPORADA DE INVIERNO:

- PRUEBA TEMPRANA (TAN PRONTO COMO NOTE SÍNTOMAS)
- Vuelva a realizar la prueba si los resultados son negativos y tiene síntomas
- Quédese en casa y aíslese cuando esté enfermo, si es posible
- Use una mascarilla de alta calidad y que le quede bien a los demás, especialmente si está enfermo o ha estado expuesto a alguien con COVID-19
- Si da positivo, llame a su proveedor de atención médica o centro de atención de urgencia para recibir tratamiento. Si no tiene un proveedor, llame al 833-686-5051 (6:00 AM - 5:00 PM, los 7 días de la semana) o programe una cita en línea en sesamecare.com/covidca

Para obtener más información sobre COVID-19, llame a la **Línea de apoyo a la comunidad at 510-268-2101**

