

# 哪一種疫苗適合我？

CDC推薦所有年滿6個月者接種COVID-19疫苗，從而預防住院及死亡。每位年滿5歲者都應接種可以獲取的加強劑。先前的加強劑是單價的，僅針對原始病毒株，而升級版的加強劑是二價的，可有針對性的抵禦原始病毒株以及導致最近大部分病例的奧密克戎變種株。

## 疫苗選擇

### 輝瑞-生物科技(輝瑞)

- 輝瑞疫苗初始針劑有兩劑，間隔八周接種。
  - » 輝瑞，也加叫Comirnaty，已經FDA全面批准為年滿12歲者接種。
  - » 輝瑞有FDA緊急使用授權(EUA)供5至11歲者接種。
- 輝瑞的3劑初始針劑系列共有三劑，第二劑與第一劑間隔三周，第三劑與第二劑間隔至少八周。輝瑞有FDA緊急使用授權供6個月至4歲者接種。
- 輝瑞的1劑升級版加強劑(二價)有FDA緊急使用授權供滿5歲者接種。加強劑與接種者的最後一劑疫苗間隔至少為兩個月。

### 莫德納

- 莫德納2劑初始系列有兩劑，間隔四至八周接種。
  - » 莫德納，也叫Spikevax，已經FDA全面批准為年滿18歲者接種。
  - » 莫德納有FDA緊急使用授權供6個月至17歲者接種。
- 莫德納的1劑升級版加強劑(二價)有FDA緊急使用授權供滿6歲者接種。加強劑與接種者的最後一劑疫苗間隔至少為兩個月。

### 諾瓦瓦克斯COVID-19佐劑疫苗(諾瓦瓦克斯)

- 諾瓦瓦克斯的2劑初始系列有兩劑，間隔三至八周接種。諾瓦瓦克斯有FDA緊急使用授權供滿12歲者接種。年滿18歲者在完成初始系列後，若未曾接種過COVID-19加強劑，則可以接種一劑諾瓦瓦克斯加強劑(單價)。

### 強生

- 強生有FDA緊急使用授權供滿18歲者接種。它既可以作為單劑初始系列也可以作為加強劑(單價)使用。強生加強劑與接種者的最後一劑疫苗間隔至少為兩個月。

\*諾瓦瓦克斯或強生疫苗僅限年滿18歲者出于健康原因無法接種其他COVID-19疫苗、不能獲取其他疫苗或若不接種此疫苗。



接下一頁

# 哪一種疫苗適合我？

## 加強劑

對疾病或感染的免疫力會在一段時間內自然消滅。加強劑是很多疫苗系列中常見的一部分，用以保證一個人對感染某種疾病保持最佳的抵抗力。加強劑可增強對嚴重COVID-19病症的抵禦、修復在接種第一劑後可能減退的免疫力。資格條件包括：

- **每位**年滿5歲者都應在完成初始系列或最近一針加強劑（單價）後接種升級版加強劑（二價）。

瞭解針劑間隔時間的更多訊息，請見[加州公共衛生部 — 不同年齡段的COVID-19疫苗接種時間概覽](#)。

加州公共衛生部COVID-19加強劑網站上也有更多訊息提供。

