

የበልግ-ክረምት ክትባቶች

እነዚህ ክትባቶች እስካሁን ድረስ አስፈላጊ የሆኑት ለምንድን ነው?

የCOVID-19፣ የኢንፍሉዌንዛ (ጉንፋን) እና የመተንፈሻ አካላት ሲንሲታ ቫይረስ (RSV) ክትባቶች በከባድ በሽታ የመያዝ ስጋትን ይቀንሳሉ። ሶስቱንም ክትባቶች በአንድ ጊዜ ማግኘት ይችላሉ።

ክትባት

እንዲሰጠው የሚመከረው ለማን ነው?

ኢንፍሉዌንዛ



ዲላማ የሚያደርገው 3 የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ስትሬይኖችን ነው።

6 ወር የሞላው እና ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው በየዓመቱ አንድ ዶዛ መውሰድ አለበት።

8 ዓመት የሞላቸው እና ከዚያ በታች የሆኑ ህጻናት በመጀመርያው ወቅታቸው ሁለት ዶዛ መውሰድ አለባቸው።

COVID-19



አሁን ካሉት የቫይረሱ አይነቶች ጋር ይበልጥ በሚቀራረብ ደረጃ ለማዘመድ ወቅታዊ ተደርጓል።

ወቅታዊ የተደረጉት Moderna፣ Pfizer እና Novavax ክትባቶች ይገኛሉ።

CDC 6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆነው ማንኛውም ሰው (የመጨረሻውን ዶዛ ከወሰደ ቢያንስ ከ2 ወራት በኋላ) በየዓመቱ ወቅታዊ የተደረገውን የCOVID-19 ክትባት እንዲወስድ ይመክራል።

- ከዚህ በፊት አንድም ጊዜ ተከትበው የማያውቁ አብዛኛዎቹ ሰዎች ክትባት ወስደዋል ለመባል አንድ ዶዛ Pfizer/Moderna ወይም ሁለት ዶዛ Novavax ክትባት መውሰድ ይኖርባቸዋል።
- ቀደም ሲል ክትባት ወስደው የማያውቁ እድሜያቸው ከ6 ወር እስከ 4 ዓመት የሆኑ ህጻናት ሁለት ወይም ሶስት ዶዛ የCOVID-19 ክትባት መውሰድ አለባቸው።

RSV¹



ዲላማ የሚያደርገው የመተንፈሻ አካላት ሲንሲታ ቫይረስ (RSV)ን ነው። RSV በጨቅላ ህጻናት እና እድሜያቸው በገፋ አዋቂዎች ላይ ከባድ የመተንፈሻ አካል በሽታ ሊያስከትል ይችላል።

75 ዓመት የሞላቸው እና ከዚያ በላይ የሆኑ አዋቂዎች አንድ ዶዛ መውሰድ አለባቸው። እድሜያቸው 60 እስከ 74 የሆናቸው አዋቂዎች በከባድ በሽታ የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ከሆነ አንድ ዶዛ መውሰድ አለባቸው።

ነፍሰ ጡር ሴቶች በRSV ወቅት ከ32ኛው እስከ 36ኛው ሳምንት ድረስ አንድ ዶዛ መውሰድ አለባቸው (ህጻኑ ከተወለደ በኋላ ለወራት የሚቆይ መከላከያ ያገኛል)።

¹ አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት የRSV ክትባት ካልወሰደች፣ ህጻኑ አንድ ዶዛ RSV ሞኖሲዮናል አንቲቦዲ/ፀረ እንግዳ አካላት እንዲወስድ ይመክራል። እስከ 19 ወር የሆናቸው ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው ህጻናት/ልጆችም አንድ ዶዛ እንዲወስዱ ይመክራል።



Public Health Department
Alameda County Health

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ ይህን ድረገጽ ይጎብኙ [covid-19.acgov.org/vaccines](https://www.cdc.gov/covid-19/acgov/vaccines)
ወይም QR ኮዱን ስካን ያድርጉ።



የበልግ-ክረምት ክትባቶች

እነዚህ ክትባቶች እስካሁን ድረስ አስፈላጊ የሆኑት ለምንድን ነው?

የCOVID-19፣ የኢንፍሉዌንሻ (ጉንፋን) እና የመተንፈሻ አካላት ሲንሲታ ቫይረስ (RSV) ክትባቶች በከባድ በሽታ የመያዝ ስጋትን ይቀንሳሉ። ሶስቱንም ክትባቶች በአንድ ጊዜ ማግኘት ይቻላል።

ክትባት

እንዲሰጠው የሚመከረው ለማንኛው ነው?

ኢንፍሉዌንሻ (Influenza)



ዲላማ የሚያደርገው 3 የኢንፍሉዌንሻ ቫይረስ ስትሬይዎችን ነው።

6 ወር የሞላው እና ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው በየዓመቱ አንድ ዶዝ መውሰድ አለበት።

8 ዓመት የሞላቸው እና ከዚያ በታች የሆኑ ህጻናት በመጀመሪያው ወቅታቸው ሁለት ዶዝ መውሰድ አለባቸው።

COVID-19



አሁን ካሉት የቫይረሱ አይነቶች ጋር ይበልጥ በሚቀራረብ ደረጃ ለማዛመድ ወቅታዊ ተደርጓል።

ወቅታዊ የተደረጉት Moderna፣ Pfizer እና Novavax ክትባቶች ይገኛሉ።

CDC 6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆነው ማንኛውም ሰው (የመጨረሻውን ዶዝ ከወሰደ ቢያንስ ከ2 ወራት በኋላ) በየዓመቱ ወቅታዊ የተደረገውን የCOVID-19 ክትባት እንዲወስድ ይመክራል።

- ከዚህ በፊት አንድም ጊዜ ተከትበው የማያውቁ አብዛኛዎቹ ሰዎች ክትባት ወስደዋል ለመባል አንድ ዶዝ Pfizer/Moderna ወይም ሁለት ዶዝ Novavax ክትባት መውሰድ ይኖርባቸዋል።
- ቀደም ሲል ክትባት ወስደው የማያውቁ እድሜያቸው ከ6 ወር እስከ 4 ዓመት የሆኑ ህጻናት ሁለት ወይም ሶስት ዶዝ የCOVID-19 ክትባት መውሰድ አለባቸው።

RSV¹



ዲላማ የሚያደርገው የመተንፈሻ አካላት ሲንሲታ ቫይረስ (RSV)ን ነው። RSV በጨቅላ ህጻናት እና እድሜያቸው በገፋ አዋቂዎች ላይ ከባድ የመተንፈሻ አካል በሽታ ሊያስከትል ይችላል።

75 ዓመት የሞላቸው እና ከዚያ በላይ የሆኑ አዋቂዎች አንድ ዶዝ መውሰድ አለባቸው። እድሜያቸው 60 እስከ 74 የሆናቸው አዋቂዎች በከባድ በሽታ የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ከሆነ አንድ ዶዝ መውሰድ አለባቸው።

ነፍሰ ጡር ሴቶች በRSV ወቅት ከ32ኛው እስከ 36ኛው ሳምንት ድረስ አንድ ዶዝ መውሰድ አለባቸው (ህጻኑ ከተወለደ በኋላ ለወራት የሚቆይ መከላከያ ያገኛል)።

¹ አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት የRSV ክትባት ካልወሰደች፣ ህጻኑ አንድ ዶዝ RSV ሞኖሲዮናል አንቲቦዲ/ፀረ እንግዳ አካላት እንዲወስድ ይመክራል። እስከ 19 ወር የሆናቸው ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው ህጻናት/ልጆችም አንድ ዶዝ እንዲወስዱ ይመክራል።



Public Health Department
Alameda County Health

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ ይህን ድረገጽ ይጎብኙ [covid-19.acgov.org/vaccines](https://www.covid-19.acgov.org/vaccines)
ወይም QR ኮድን ስካን ያድርጉ።



የበልግ-ክረምት ክትባቶች

እነዚህ ክትባቶች እስካሁን ድረስ አስፈላጊ የሆኑት ለምንድን ነው?

የCOVID-19፣ የኢንፍሉዌንዛ (ጉንፋን) እና የመተንፈሻ አካላት ሲንሲታ ቫይረስ (RSV) ክትባቶች በከባድ በሽታ የመያዝ ስጋትን ይቀንሳሉ። ሶስቱንም ክትባቶች በአንድ ጊዜ ማግኘት ይቻላል።

ክትባት

እንዲሰጠው የሚመከረው ለማንኛው ነው?

ኢንፍሉዌንዛ (Influenza)



ዲላማ የሚያደርገው 3 የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ስትሬይዎችን ነው።

6 ወር የሞላው እና ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው በየዓመቱ አንድ ዶዝ መውሰድ አለበት።

8 ዓመት የሞላቸው እና ከዚያ በታች የሆኑ ህጻናት በመጀመሪያው ወቅታቸው ሁለት ዶዝ መውሰድ አለባቸው።

COVID-19



አሁን ካሉት የቫይረሱ አይነቶች ጋር ይበልጥ በሚቀራረብ ደረጃ ለማዛመድ ወቅታዊ ተደርጓል።

ወቅታዊ የተደረጉት Moderna፣ Pfizer እና Novavax ክትባቶች ይገኛሉ።

CDC 6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆነው ማንኛውም ሰው (የመጨረሻውን ዶዝ ከወሰደ ቢያንስ ከ2 ወራት በኋላ) በየዓመቱ ወቅታዊ የተደረገውን የCOVID-19 ክትባት እንዲወስድ ይመክራል።

- ከዚህ በፊት አንድም ጊዜ ተከትበው የማያውቁ አብዛኛዎቹ ሰዎች ክትባት ወስደዋል ለመባል አንድ ዶዝ Pfizer/Moderna ወይም ሁለት ዶዝ Novavax ክትባት መውሰድ ይኖርባቸዋል።
- ቀደም ሲል ክትባት ወስደው የማያውቁ እድሜያቸው ከ6 ወር እስከ 4 ዓመት የሆኑ ህጻናት ሁለት ዶዝ መውሰድ ስለሚችሉ የCOVID-19 ክትባት መውሰድ አለባቸው።

RSV¹



ዲላማ የሚያደርገው የመተንፈሻ አካላት ሲንሲታ ቫይረስ (RSV)ን ነው። RSV በጨቅላ ህጻናት እና እድሜያቸው በገፋ አዋቂዎች ላይ ከባድ የመተንፈሻ አካል በሽታ ሊያስከትል ይችላል።

75 ዓመት የሞላቸው እና ከዚያ በላይ የሆኑ አዋቂዎች አንድ ዶዝ መውሰድ አለባቸው። እድሜያቸው 60 እስከ 74 የሆናቸው አዋቂዎች በከባድ በሽታ የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ከሆነ አንድ ዶዝ መውሰድ አለባቸው።

ነፍሰ ጡር ሴቶች በRSV ወቅት ከ32ኛው እስከ 36ኛው ሳምንት ድረስ አንድ ዶዝ መውሰድ አለባቸው (ህጻኑ ከተወለደ በኋላ ለወራት የሚቆይ መከላከያ ይገኛል)።

¹ አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት የRSV ክትባት ካልወሰደች፣ ህጻኑ አንድ ዶዝ RSV ሞኖሲዮናል አንቲቦዲ/ፀረ እንግዳ አካላት እንዲወስድ ይመክራል። እስከ 19 ወር የሆናቸው ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው ህጻናት/ልጆችም አንድ ዶዝ እንዲወስዱ ይመክራል።



Public Health Department
Alameda County Health

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ ይህን ድረገጽ ይጎብኙ [covid-19.acgov.org/vaccines](https://www.covid-19.acgov.org/vaccines) ወይም QR ኮዱን ስካን ያድርጉ።

