

# ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរដូវរងារឈឺជ្រុះស្លឹក-ត្រជាក់

## ហេតុអ្វីថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-19 ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ និងជំងឺផ្លូវដង្ហើម Respiratory Syncytial Virus (ជំងឺ RSV) កាត់បន្ថយហានិភ័យកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកអាចទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងបីនេះក្នុងពេលតែមួយ។

## ថ្នាំវ៉ាក់សាំង

## តើជនណាគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ?

### ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ



ការពារមេរោគជំងឺ  
គ្រុនផ្តាសាយ 4  
ប្រភេទ។

**មនុស្សគ្រប់រូបអាយុ 6 ខែ និងច្រើនជាងនេះ** គួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួនមួយដូស ទោះបីមានអាឡែកស៊ីនីងស៊ីតក៏ដោយ។  
**កុមារអាយុ 8 ឆ្នាំ និងតិចជាងនេះ** គួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួនពីរដូស ក្នុងរដូវរងារលើកដំបូងរបស់ខ្លួន។

### ជំងឺកូវីដ-19



បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព  
ដើម្បីការពារប្រភេទ  
XBB, មេរោគបម្លែងពី  
Omicron។  
  
មានថ្នាំវ៉ាក់  
សាំង Moderna, Pfizer  
& Novavax ។

CDC ណែនាំថា **មនុស្សគ្រប់រូបអាយុ 6 ខែ និងច្រើនជាងនេះ** អាចទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-19 ថ្មី ក្នុងពេលយ៉ាងតិច 2 ខែបន្ទាប់ពីដួសចុងក្រោយរបស់ខ្លួន។

- មនុស្សភាគច្រើនដែលមិនធ្លាប់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ត្រូវចាក់ថ្នាំ Pfizer/Moderna ចំនួនមួយដូស ឬក៏ថ្នាំ Novavax ចំនួនពីរដូស ដើម្បីឱ្យទាន់បច្ចុប្បន្នភាព។
- កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំ ដែលមិនធ្លាប់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង នៅតែត្រូវបានណែនាំឱ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-19 ចំនួនពីរ ឬក៏បីដូសដដែល។

### ជំងឺ RSV<sup>1</sup>



ការពារជំងឺផ្លូវដង្ហើម  
Respiratory Syncytial  
Virus (ជំងឺ RSV)។ RSV  
អាចបង្កជំងឺផ្លូវដង្ហើម  
ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទារក និង  
ចាស់ជរា។

**មនុស្សចាស់អាយុ 60 ឆ្នាំ និងច្រើនជាងនេះ** គួរសួរព័ត៌មានអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព/ឱសថការីរបស់ខ្លួន អំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺ RSV។

**ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ** គួរតែចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយដូសនៅក្នុងសប្តាហ៍ 32 និង 36 ក្នុងរដូវរងារជំងឺ RSV (ទារកនឹងទទួលបានការការពាររយៈពេលច្រើនខែ ក្រោយពេលកើត។

<sup>1</sup>ប្រសិនបើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺ RSV ទេ ទារកត្រូវបានណែនាំឱ្យទទួលថ្នាំ RSV monoclonal antibody។ ទារក/ក្មេង ដែលមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ អាយុកាន់តែច្រើន រហូតដល់ 19 ខែ ក៏ត្រូវបានណែនាំឱ្យទទួលថ្នាំចំនួនមួយដូសផងដែរ។



សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ចូលទៅ  
[covid-19.acgov.org/vaccines](https://covid-19.acgov.org/vaccines)  
ឬស្កេន QR Code៖

