

가을~겨울 백신

가을~겨울 백신이 중요한 이유는?

COVID-19, 독감 및 호흡기세포융합바이러스(RSV) 백신은 중증 질환의 위험을 낮춥니다. 세 가지 백신을 모두 한꺼번에 접종받을 수도 있습니다.

백신

추천되는 대상자는?

독감



4가지 변종의 독감 바이러스를 표적으로 합니다.

계란 알레르기가 있는 사람도 포함하여, **6개월 이상의 나이는 모두** 접종받아야 합니다.

8세 이하의 어린이는 첫 계절에 2회의 접종을 받아야 합니다.

COVID-19



오미크론의 하위변이체 XBB를 표적으로 하도록 업데이트.

업데이트된 모더나, 화이저 및 노바백스 백신을 접종받을 수 있습니다.

질병관리센터(CDC)에서는 **6개월 이상 나이의 모든 사람**이 마지막 접종 뒤 최소 2개월이 경과한 후 업데이트된 COVID-19 백신을 접종받도록 권장합니다.

- 백신을 접종받은 적이 아예 없는 사람 중 대부분의 경우, 한 회의 화이저/모더나 또는 두 회의 노바백스를 접종받으면 최신 상태라고 볼 수 있습니다.
- 백신을 접종받은 적이 아예 없는 6개월 내지 4세의 어린이는 계속해서 두 회 또는 세 회 중 한 가지의 COVID-19 백신을 접종받도록 권장됩니다.

RSV¹



호흡기세포융합바이러스(RSV) 표적. RSV는 신생아와 고령자에게 중증의 호흡질환을 유발할 수 있습니다.

60세 이상의 성인은 담당 건강관리 제공자/약사에게 RSV 백신에 대해 문의할 수 있습니다.

임산부는 RSV 계절 32 내지 36주차 사이 접종받아야 합니다(분만 후 아기가 몇달간 보호를 받습니다).

¹ 임산부가 RSV 백신을 접종받지 않은 경우, 아기가 한 회의 RSV 단일클론 항체를 받도록 권장됩니다. 고위험군에 속하는 아기/19월까지의 유아 또한 접종받도록 권장됩니다.

