

情況說明書：莫德納 (Moderna) COVID-19疫苗 (Spikevax) 的益處與風險

基於全國專家的細緻審查，我們知道COVID-19疫苗的益處遠遠大於風險。瞭解接種莫德納COVID-19疫苗的益處與風險。此疫苗有可能為您預防COVID-19。您可以選擇接種這種疫苗。

關於此疫苗

此疫苗已經FDA全面批准為滿18歲者接種。此疫苗經FDA緊急授權為6個月至17歲者接種。此疫苗有兩劑，間隔四至八周接種。接種部位為上臂肌肉。

此疫苗益處

此疫苗已被證明可以預防COVID-19引發的嚴重病症、住院及死亡。

接種疫苗時預計會出現什麼反應

您可能會出現一些副作用，而它們都是您身體正在對此疾病生成免疫力的正常表徵。副作用包括在注射處疼痛或腫脹、頭痛、感到疲勞、肌肉疼、噁心或發燒。副作用應在幾天之內消失。

與此疫苗相關的風險

儘管接種COVID-19疫苗有少量風險，但是接種疫苗的好處大過風險。風險包括：

- 罕見嚴重過敏反應：通常在接種幾分鐘或一小時後，疫苗會有非常小的可能性引發嚴重過敏反應（呼吸困難、面部及喉嚨腫脹、心跳加快、全身嚴重皮疹、頭暈、乏力）。如果您出現嚴重過敏反應，請撥打9-1-1或去最近的醫院就醫。
- 罕見心肌炎和心包炎：在接種莫德納COVID-19疫苗後，有極少數人得了心肌炎和心包炎。所報告病例的大多數為男性、年輕的成年人，且患者在接種過第二劑疫苗後報告呼吸急促及胸痛。在就醫後，患者對治療及休息的反應良好且症狀很快好轉。如果您出現心肌炎或心包炎的症狀，就應當及時就醫。症狀包括：胸痛、呼吸急促或異常心律（心跳快、心悸或心跳加重）。

如果您出現副作用

如果您出現嚴重過敏反應，請撥打9-1-1或去最近的醫院就醫。若出現任何讓您感到不適的副作用或副作用不消失，請致電您的疫苗提供者或保健服務提供者。

疫苗選擇

您可選擇接種此疫苗，且不接種它也不會改變您的標準醫療服務。其他可以預防COVID-19的疫苗也可供接種。進一步瞭解您的選擇，請查閱[輝瑞 \(Pfizer\) COVID-19 \(Comirnaty\) 疫苗益處與風險情況說明書](#)。

接下一頁。

情況說明書：莫德納 (Moderna) COVID-19疫苗 (Spikevax) 的益處與風險

加強劑

對疾病或感染的免疫力會在一段時間內自然消滅。加強劑是很多疫苗系列中常見的一部分，用以保證一個人對感染某種疾病保持最佳的抵抗力。加強劑可增強對嚴重COVID-19病症的抵禦、修復在接種第一劑後可能減退的免疫力。包括莫德納在內的mRNA疫苗可以被用作加強劑供所有符合條件者接種，且與其初始針劑接種的疫苗類型無關。(請見輝瑞的情況說明書以瞭解另一種mRNA疫苗。)先前的加強劑是單價的，僅抵禦一種病毒株，而升級版的加強劑是二價的並增加了對導致最近大部分病例的奧密克戎變種株的防護。資格條件包括：

- 每位年滿5歲者都應在完成初始系列或最近一針加強劑(單價)後接種升級版加強劑(二價)。

更多訊息

瞭解針劑間隔時間的更多訊息，請見[加州公共衛生部 — 不同年齡段的COVID-19疫苗接種時間概覽](#)。

加州公共衛生部COVID-19加強劑網站上也有更多訊息提供。

