

# بيان حقائق: الفوائد والمخاطر الخاصة باللقاح المساعد من Novavax ضد كوفيد-١٩

بناءً على مراجعة دقيقة بواسطة خبراء وطنيين، إننا نعلم أن فوائد لقاحات كوفيد-١٩ تفوق المخاطر بكثير. تعلم فوائد و مخاطر الحصول على لقاح كوفيد-١٩ المساعد من Novavax، والذي يمكن أن يقيك من الإصابة بكوفيد-١٩. إنه إختيارك أن تحصل على هذا اللقاح. تحدث مع مقدم الخدمة للقاحات إذا كانت لديك أسئلة.

## حول هذا اللقاح

هذا اللقاح حاصل من FDA على تصريح الإستخدام الطارئ للأشخاص من عمر ١٢ عام و أكبر. هذا اللقاح عبارة عن مسلسل من جرعتين، يعطوا في مدة ثلاثة إلى ثمانية أسابيع فيما بينهما، و يحقن في عضلة أعلى الذراع.

## متي ينبغي أن تأخذ هذا اللقاح في الاعتبار

- بعض الأفراد لا يمكنهم الحصول على لقاح كوفيد-١٩ آخر لأسباب طبية (على سبيل المثال، بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا قد اختبروا رد فعل تحسسي شديد بعد جرعة سابقة).
- بعض الأفراد يختارون أن يحصلوا على لقاح كوفيد-١٩ من نوفافاكس لأنهم لن يحصلوا على لقاح لكوفيد-١٩ خلاف ذلك.
- بعض الأفراد الذين لديهم محدودية في الوصول للقاحات كوفيد-١٩ والذين كانوا قد يظلوا غير مطعمين ضد كوفيد-١٩.
- نحن نوصي هؤلاء الأفراد أن يناقشوا خيارات لقاحات كوفيد-١٩ مع مقدم خدمات طبية.

## ماذا تتوقع عند الحصول على اللقاح

قد تختبر بعض الأعراض الجانبية، وهي علامة طبيعية أن جسمك يبني مناعة ضد المرض. الأعراض الجانبية قد تتضمن تفاعل مكان الحقن، صداع، إحساس بالإرهاق، ألم بالعضلات، إحساس بالغثيان، أو سخونة. الأعراض الجانبية يجب أن تختفي في خلال أيام قليلة.

## المخاطر المرتبطة بهذا اللقاح

رغم أن هناك مخاطر بسيطة مرتبطة بالحصول على لقاح كوفيد-١٩، فوائد الحصول على اللقاح تفوق المخاطر. المخاطر تشمل:

- نادراً، رد فعل تحسسي شديد: هناك فرصة بعيدة أن اللقاح قد يتسبب في رد فعل تحسسي شديد (صعوبة في التنفس، تورم في الوجه والحلق، سرعة في نبضات القلب، طفح جلدي شديد بالجسم كله، دوار، ضعف) و التي تحدث عادة في خلال دقائق قليلة إلى ساعة بعد الحصول على الجرعة. إذا اختبرت رد فعل تحسسي شديد إتصل ب ٩-١-١ أو إذهب إلى أقرب مستشفى.
- نادراً إلتهاب في عضلة القلب أو إلتهاب في غشاء التامور: البيانات من التجارب السريرية قدمت دليل على زيادة مخاطر حدوث إلتهاب عضلة القلب و إلتهاب غشاء التامور بعد الحصول على لقاح كوفيد-١٩ المساعد من Novavax. في أغلب هذه الحالات، الأعراض بدأت في خلال ١٠ أيام بعد الحصول على اللقاح. يجب أن ترى طبيب إذا اختبرت أعراض إلتهاب عضلة القلب أو إلتهاب غشاء التامور، مثل ألم بالصدر، ضيق بالتنفس، أو ضربات قلب غير طبيعية (ضربات سريعة، رفرقة، أو خفقان).

## إذا اختبرت أعراض جانبية

نادراً رد فعل تحسسي شديد: إذا اختبرت رد فعل تحسسي شديد إتصل ب ٩-١-١ أو إذهب إلى أقرب مستشفى. إتصل بمقدم الخدمة للقاحات أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت هناك أية أعراض جانبية تضايقك أو لا تتحسن

يستكمل في الصفحة التالية.

# بيان حقائق: الفوائد والمخاطر الخاصة باللقاح المساعد من Novavax ضد كوفيد-١٩

## خيارات الحصول على اللقاح

أنه إختيارك أن تحصل على اللقاح و عدم حصولك عليه لن يغير من رعايتك الطبية العادية. هناك لقاحات أخرى متاحة للحماية من كوفيد-١٩. تعلم المزيد عن الخيارات المتاحة عن طريق قراءة [بيان حقائق فوائد و مخاطر لقاح كوفيد-١٩ من Pfizer \(Comirnaty\) أو بيان حقائق فوائد و مخاطر لقاح كوفيد-١٩ من Moderna \(Spikevax\)](#)

## الجرعات التعزيزية

المناعة ضد الأمراض والعدوى تضعف طبيعياً مع الوقت. الجرعة التعزيزية هي جزء طبيعي من أغلب سلاسل اللقاحات لضمان أن الفرد يحافظ على المناعة المطلوبة ضد العدوى بمرض ما. الجرعات التعزيزية تزيد من الحماية ضد كوفيد-١٩ الشديد، و تسترد المناعة التي قد تكون خفتت منذ الحصول على الجرعة الأولى. من فضلك إقرأ بيان الحقائق من فايزر أو بيان الحقائق من مودرنا للمزيد من المعلومات عن الجرعات التعزيزية المحدثة (ثنائية التكافؤ). الأهلية تشمل:

- **الجميع** من عمر ١٢ عام وأكبر ينبغي أن يحصلوا على جرعة تعزيزية محدثة (ثنائية التكافؤ) بعد إستكمال السلسلة الأولية الخاصة بهم.
- أولئك من عمر ١٨ عام و أكبر يمكنهم الحصول على جرعة تعزيزية (أحادية التكافؤ) من Novavax بعد إستكمال السلسلة الأولية الخاصة بهم إذا كانوا لم يحصلوا على جرعة تعزيزية لكوفيد-١٩ سابقاً.

## مزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات عن الفترات ما بين الجرعات إقرأ [توقيتات لقاح كوفيد-١٩ حسب السن من قطاع الصحة العامة بكاليفورنيا](#). معلومات إضافية متاحة على موقع الجرعات التعزيزية لكوفيد-١٩ من قطاع الصحة العامة بكاليفورنيا.

