

# 情況說明書：諾瓦瓦克斯 (Novavax) COVID-19 佐劑疫苗的益處與風險

基於全國專家的細緻審查，我們知道 COVID-19 疫苗的益處遠遠大於風險。瞭解接種諾瓦瓦克斯 COVID-19 佐劑疫苗的益處與風險。此疫苗有可能為您預防 COVID-19。您可以選擇接種這種疫苗。如有問題，請與您的疫苗提供者聯繫。

## 有關此疫苗

經 FDA 批准，此疫苗已經被授權為滿 12 歲者緊急使用。此疫苗有兩劑，間隔三至八周接種。接種部位為上臂肌肉。

## 您應什麼時候考慮接種此疫苗

- 有些人出於健康原因無法接種另一種 COVID-19 疫苗（比如，有些人可能在接種過先前一劑後出現嚴重過敏反應）。
- 有些人選擇接種諾瓦瓦克斯疫苗是因為如果不接種這種疫苗則無法接種任何 COVID-19 疫苗。
- 有些人無法獲取其他 COVID-19 疫苗，並可能因此而不能接種疫苗來預防 COVID-19。
- 我們建議這些人與其醫療服務提供者探討 COVID-19 疫苗的不同選擇。

## 在接種此疫苗時會發生什麼

您可能會出現一些副作用，而它們都是您身體正在對此疾病生成免疫力的表徵。副作用包括在注射處疼痛、頭痛、感到疲勞、肌肉疼、噁心或發燒。副作用應在幾天之內消失。

## 與此疫苗相關的風險

儘管接種 COVID-19 疫苗有少量風險，接種疫苗的益處仍大於風險。風險包括：

- 罕見嚴重過敏反應：通常在接種後幾分鐘或一小時後，疫苗會有非常小的可能性引發嚴重過敏反應（呼吸困難、面部及喉嚨腫脹、心跳加快、全身嚴重皮疹、頭暈、虛脫）。如果您出現嚴重過敏反應，請撥打 9-1-1 或去最近的醫院就醫。
- 罕見心肌炎和心包炎：臨床試驗資料有證據證明，在接種諾瓦瓦克斯 COVID-19 佐劑疫苗後，得心肌炎和心包炎的風險會增加。在多數這樣的病例中，症狀將在接種過後 10 天內出現。如果您出現心肌炎或心包炎的症狀，請及時就醫。症狀包括：胸部疼痛、氣短或異常心律（心跳快、心悸或心跳加重）。

## 如果您出現副作用

如果您出現嚴重過敏反應，請撥打 9-1-1 或去最近的醫院就醫。如果有任何讓您感到不適的副作用或副作用不消失，請打電話給您的疫苗提供者或保健服務提供者。

## 疫苗選擇

您可選擇接種此疫苗，且不接種它也不會改變您的標準醫療服務。其他可以預防 COVID-19 的疫苗也可供接種。進一步瞭解您的選擇，請查閱 [輝瑞 \(Pfizer\) COVID-19 \(Comirnaty\) 疫苗益處與風險情況說明書](#) 或 [莫德納 \(Moderna\) COVID-19 \(Spikevax\) 疫苗益處與風險情況說明書](#)。

接下一頁。

# 情況說明書：諾瓦瓦克斯 (Novavax) COVID-19 佐劑疫苗的益處與風險

## 加強劑

對疾病或感染的免疫力會在一段時間內自然消滅。加強劑是很多疫苗系列中常見的一部分，用以保證一個人對感染某種疾病保持最佳的抵抗力。加強劑可增強對嚴重 COVID-19 病症的抵禦、修復在接種第一劑後可能減退的免疫力。請見輝瑞情況說明書或莫德納情況說明書來瞭解有關升級版加強劑（二價）的更多訊息。資格條件包括：

- 每位滿 12 歲者都應在完成初始針劑後接種升級版的加強劑（二價）。
- 已滿 18 歲者若未曾接種過 COVID-19 加強劑，就可以在完成初始系列後接種一針諾瓦瓦克斯加強劑（單價）。

## 更多資訊

瞭解更多有關針劑間隔時間的資訊，請查閱 [CDPH's COVID-19 Vaccine Timing by Age](#)。更多資訊也可到 CDPH COVID-19 加強劑網站查詢。

