

بيان حقائق: فوائد و مخاطر لقاح كوفيد-١٩ من فايزر (Comirnaty)

بناء على مراجعة دقيقة بواسطة خبراء وطنيين، إننا نعلم أن فوائد لقاحات كوفيد-١٩ تفوق المخاطر بكثير. تعلم فوائد و مخاطر الحصول على لقاح كوفيد-١٩ من فايزر، الذي يمكن أن يقيك من الإصابة بكوفيد-١٩. إنه اختياري أن تحصل على هذا اللقاح.

حول هذا اللقاح

هذا اللقاح تم الموافقة عليه بشكل كامل من FDA للأشخاص من عمر ١٢ عام وأكبر. هذا اللقاح حاصل على تصريح الاستخدام الطارئ من FDA للأشخاص من عمر ٦ أشهر إلى ١١ عام. هؤلاء من عمر ٥ سنوات وأكبر يتم إعطائهم سلسلة من جرعتين، ثلاثة إلى ثمانية أسابيع فيما بينهما. هؤلاء الذين أعمارهم بين ٦ أشهر و ٤ سنوات يتم إعطائهم سلسلة من ثلاث جرعات، الجرعة الثانية تعطى بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، الجرعة الثالثة تعطى بعد ثمانية أسابيع من الجرعة الثانية. هذا اللقاح يحقن في العضلة أعلى الذراع أو الفخذ.

فوائد هذا اللقاح

هذا اللقاح تبين أنه يمنع المرض الشديد، دخول المستشفى والوفاة من كوفيد-١٩.

ماذا تتوقع عندما تحصل على اللقاح

قد تختبر بعض الأعراض الجانبية، وهي علامة طبيعية أن جسمك يبني مناعة ضد المرض. الأعراض الجانبية قد تشمل تفاعل في مكان الحقن، صداع، إحساس بالإرهاق، ألم بالعضلات، غثيان أو حمى. الأعراض الجانبية يجب أن تختفي في خلال أيام قليلة

المخاطر المرتبطة بالحصول على هذا اللقاح

رغم أن هناك مخاطر بسيطة مرتبطة بالحصول على لقاح كوفيد-١٩، فوائد الحصول على اللقاح تفوق المخاطر. المخاطر تشمل:

- نادرا، رد فعل تحسسي شديد: هناك فرصة بعيدة أن اللقاح قد يتسبب في رد فعل تحسسي شديد (صعوبة في التنفس، تورم في الوجه والحلق، سرعة في نبضات القلب، طفح جلدي شديد بالجسم كله، دوار، ضعف) و التي تحدث عادة في خلال دقائق قليلة إلى ساعة بعد الحصول على الجرعة. إذا اختبرت رد فعل تحسسي شديد إتصل ب ٩-١-١ أو إذهب إلى أقرب مستشفى.
- نادرا، التهاب في عضلة القلب أو التهاب في غشاء التامور: لقد كان هناك حالات نادرة من التهاب عضلة القلب والتهاب غشاء التامور بعد الحصول على [لقاح كوفيد-١٩ من فايزر](#). في أغلب هذه الحالات المبلغ عنها، المرضى كانوا ذكور، بالغين صغار بالعمر الذين أبلغوا عن ضيق بالتنفس وألم بالصدر بعد حصولهم على الجرعة الثانية. عندما قدموا للحصول على الرعاية الطبية، كانوا يستجيبون بشكل جيد للأدوية والراحة، مع ملاحظة تحسن سريع بالأعراض. يجب أن تحصل على رعاية طبية إذا اختبرت أي من أعراض التهاب عضلة القلب أو التهاب غشاء التامور والتي تشمل ألم بالصدر، ضيق بالتنفس، أو ضربات قلب غير طبيعية (ضربات سريعة، رفرقة، أو خفقان).

إذا اختبرت أعراض جانبية

إذا اختبرت رد فعل تحسسي شديد، إتصل ب ٩-١-١ أو إذهب إلى أقرب مستشفى. إتصل بمقدم الخدمة للقاحات أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أية أعراض جانبية تضايقك أو لا تتحسن.

خيارات الحصول على اللقاح

أنه اختياري أن تحصل على هذا اللقاح و عدم حصولك عليه لن يغير من رعايتك الطبية العادية. هناك لقاحات أخرى متاحة للوقاية من كوفيد-١٩. تعلم المزيد عن الخيارات المتاحة لديك عن طريق قراءة [بيان حقائق فوائد و مخاطر لقاح كوفيد-١٩ من Moderna \(Spikevax\)](#)

يستكمل في الصفحة التالية.

بيان حقائق: فوائد و مخاطر لقاح كوفيد-١٩ من فايزر (Comirnaty)

الجرعات التعزيزية

المناعة ضد الأمراض والعدوى تضعف طبيعياً مع الوقت. الجرعة التعزيزية هي جزء طبيعي من أغلب سلاسل اللقاحات لضمان أن الفرد يحافظ على المناعة المطلوبة ضد العدوى بمرض ما. الجرعات التعزيزية تزيد من الحماية ضد كوفيد-١٩ الشديد، وتسترد المناعة التي قد تكون خفتت منذ الحصول على الجرعة الأولى. اللقاحات بتقنية mRNA، بما فيها لقاحات فايزر، قد تستخدم كجرعات تعزيزية لجميع الأفراد المؤهلين، بصرف النظر عن نوع اللقاح المستخدم في السلسلة الأولى. (من فضلك اقرأ بيان الحقائق من مودرنا لمعلومات عن لقاح mRNA الآخر.) الجرعات التعزيزية السابقة كانت أحادية التكافؤ و كانت تحتوي على سلالة واحدة أما الجرعات التعزيزية المحدثة فهي ثنائية التكافؤ و تضيف سلالات أوميكرون المسببة لأغلب الحالات مؤخراً. الأهلية للجرعات التعزيزية تشمل:

- الجميع من عمر ٥ أعوام وأكبر ينبغي أن يحصلوا على جرعة تعزيزية محدثة (ثنائية التكافؤ) بعد إكمال السلسلة الأولى الخاصة بهم أو بعد آخر جرعة (أحادية التكافؤ)

مزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات عن الفترات ما بين الجرعات، من فضلك اقرأ [توقيتات لقاح كوفيد-١٩ حسب السن من قطاع الصحة العامة بكاليفورنيا](#).

